

ЕН ЛИЙФ

Удостоверение за регистрация в България № 761/15.06.2023 г.,
Заповед № РД 11-1397/09.06.2023 г., Заповед № РД 11-1578/21.06.2024 г.

Течен микробен тор, стимулиращ азотния метаболизъм и фотосинтетичната активност на растенията.

Състав

Консорциум от бактерии
Methylobacterium sp. AGN12,
Methylobacterium sp AGN13,
Arthrobacter sp AGN14
3x10⁹ UFC*/ml

Продуктът не съдържа генетично модифицирани организми

pH: 6

Срок на годност: 12 месеца (от датата на производство).

* CFU/ml (колонии-образуващи единици)

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА:

ПРИ ВСИЧКИ КУЛТУРИ – Препоръчителна доза на приложение: 30-50 мл/дка; Максимална доза: 100 мл/дка;

Максимален брой приложения: 2

Листно приложение върху достатъчно развита листна маса, през цялата година при всички култури.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ: 30-50 мл/дка във фаза на културата 1ви-2ри възел ВВСН 31-32

РАПИЦА: 30-50 мл/дка в края на зимата ВВСН 30 (начало на нарастване на стъблото)

ЦАРЕВИЦА: 30-50 мл/дка във фаза 4-5 лист ВВСН 14-15

СЛЪНЧОГЛЕД: 30-50 мл/дка във фаза 4-5 лист ВВСН 14-15

СОЯ: 30-50 мл/дка във фаза V2

КАРТОФИ: 30-50 мл/дка във фаза 4-5 листа ВВСН 14-15

ЗЕЛЕНЧУЦИ: 30-50 мл/дка във фаза ВВСН 13-31

ЛОЗЯ: 30-50 мл/дка във фаза ВВСН 17-71

ОВОЩНИ КУЛТУРИ: 30-50 мл/дка във фаза ВВСН 31-39

ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ: 30-50 мл/дка

ИНСТРУКЦИИ ПРИ УПОТРЕБА

Разклатете добре преди употреба.

За по-добра ефективност: използвайте продукта самостоятелно в чист разтвор.

Регулирайте обема на водата спрямо третираната повърхност.

Не прилагайте продукта 4 до 7 дни преди или след приложение на хербициди.

СМЕСИМОСТ:

Може да се смесва с повечето торове и фунгицидни разтвори, само след разреждане в крайната смес. Когато се смесва с други продукти, винаги да се прави предварителен тест за съвместимост. Добавяйте ЕН ЛИЙФ последен.

Не използвайте хлорирана вода или белина, които могат да унищожат бактериите и да направят продукта неефективен. Избягвайте смесване с хербициди. Почистете пръскачката преди употреба, за да избегнете остатъци от активни вещества преди употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригинална опаковка, далеч от пряка слънчева светлина, плътно затворена, на безопасно място, далеч от достъп на деца и животни, отделно от храни, при температура между 4°C и 25°C включително. Да се пази от замръзване. Да не се излага на замръзване и температури над 35°C

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Да не се излива в канализацията; този продукт и неговата опаковка да се унищожат по безопасен начин. Избягвайте изпускане в околната среда. Обърнете се към специалните инструкции / информационен лист за безопасност. Празните опаковки да се изплакнат трикратно. Да не се изгарят. Празните опаковки да не се използват за други цели.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрено предприятие за обезвреждане на отпадъци.

Празни опаковки/отпадъци от продукта да се предават на фирми лицензирани за унищожане на опасни отпадъци.

Съдържа *Methylobacterium sp* и *Arthobacter sp*. Микроорганизмите могат да предизвикат реакции на сенсибилизация.

Защитна маска за предпазване от аерозоли (тип EN149 FFP3 или еквивалент), ръкавици и подходящо защитно облекло да се носят от потребителя по време на всички етапи на работа с продукта.

Продуктът не трябва да се използва от хора със силен имунен дефицит на имunosупресивна терапия

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Производителят и доставчиците на този продукт гарантират, че формулацията съдържа посочените активни съставки в рамките на допустимите отклонения, когато е опакован. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид за използването на този материал и няма да се поема отговорност за щети или наранявания, произтичащи от съхранението, боравенето, прилагането или използването на този продукт.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

AGRONUTRITION - Parc Activestre - 3, av de l'Orchidée - 31390 CARBONNE (FRANCE)