

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

КОДИМУР 38 ФЛО

Функция на продукта: фунгицид.

Съдържание на активно вещество: меден оксихлорид – 690,6 г/л (Cu - 380 г/л).

Вид на формулацията: СК - суспензионен концентрат.

Категория на употреба: втора професионална.

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №:
01684-ПРЗ/1-14.03.2019г.

Притежател на разрешението:

Exclusivas Sarabia S.A. Camí de l'Albi, Rec Nou, s/n 25100 Alpicat, Lleida, Spain

Дистрибутор:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

Тел: 02 962 4901; www.sab.bg

Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж опаковката.

Партида №: виж опаковката.

Нето количество:.... L

Условия за продажба

Всички доставени от нас стоки са от високо качество и ние вярваме, че те са подходящи, но тъй като не можем да упражняваме контрол върху тяхното складиране, приготвяне на работен разтвор или използване, или метеорологичните условия преди, по време и след прилагането, които могат да повлияят на производителността на стоките, всички условия и гаранции, които са законови или други по отношение на качеството или годността за каквито и да е цели на нашите стоки, са изключени и никаква отговорност не ще бъде приета от нас или от препродавачи за неизпълнение, щета или нараняване, произтичащи от тяхното съхранение, работа, приложение или употреба. Тези условия не могат да се променят от нашия персонал или агенти, независимо дали те контролират или подпомагат използването на такива стоки.



ВНИМАНИЕ

Предупреждения за опасност:

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ЕУН 401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/ съдът да се изхвърли в определени за опасни или специални отпадъци места.

Допълнително етикетирание:

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe1: С цел опазване на почвообитаващите организми да не се прилага този или друг продукт, съдържащ а.в. мед повече от 4 кг мед/ха/година върху една и съща площ.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностните води или дюзи редуциращи отнасянето на струята 95% с цел опазване на водните организми за употреба при маслини.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 14 метра до повърхностните води или дюзи редуциращи отнасянето на струята 90% с цел опазване на водните организми за употреба при лозя винени и десертни сортове.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностните води и дюзи за намаляване на отнасянето на струята 50% или дюзи редуциращи отнасянето на струята 98% с цел опазване на водните организми за употреба при семкови и костилкови видове.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра до повърхностните води или дюзи редуциращи отнасянето на струята 75% с цел опазване на водните организми за употреба при домати и патладжани, картофи и други клубеноплодни зеленчуци, марули и други салати.

Първа помощ и медицински съвети

Вдишване: Преместете експонираното лице от района на чист въздух. Приложете кислород, ако пациентът диша със затруднение. Ако дишането спре, приложете изкуствено дишане. Потърсете медицинска помощ.

Контакт с очите: Измийте незабавно с обилно количество вода в продължение на поне 15 минути, като внимавате очите да се отворени. Премахнете контактните лещи, ако има такива и ако е възможно. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.

Поглъщане: Потърсете медицинска помощ. Никога не предизвиквайте повръщане, освен ако не бъдете инструктирани от медицинския персонал. Пазете пациента в покой. Съхранявайте телесната температура. Не оставяйте пострадалия сам в никакъв случай.

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или потърсете медицински съвет, ако състоянието на пострадалият се влоши.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Предпазни мерки за безопасна работа:

Работното място трябва да се вентилира подходящо на местата, където се получава запрашава. Избягвайте натрупването на електростатични заряди. Избягвайте образуването на прах. Избягвайте контакт с очите и кожата. Да се използва само на

открито или на добре проветриво място. Съхранявайте далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Съхранение:

Съхранявайте продукта в оригиналния му контейнер, затворен, на хладно, сухо и добре проветриво място и подходящо етикетирани. Пазете от деца, храна, напитки и фуражи. Продуктът е стабилен в продължение на 2 години при нормални условия на съхранение.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При лозя (винени сортове) за контрол на мана (*Plasmopara viticola*) с доза 240-400 мл продукт/дка, приложено със 60-100 л вода/дка. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (ВВСН 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При лозя (десертни сортове) за контрол на мана (*Plasmopara viticola*) с доза 180-360 мл продукт/дка, приложено със 60-120 л вода/дка. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (ВВСН 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При семкови овощни видове (ябълка и круша) за контрол на струпясване (*Venturia sp.*) и нектриален рак (*Nectria galligena*) с доза 240-400 мл продукт/ дка, приложено със 60-100 л вода/дка. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: От фенофаза „листата започват да пожълтяват“ до „повечето венчелистчета оформят куха топка“ (ВВСН 92-59). Зимно третиране. От прибиране до цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При костилкови овощни видове (праскови, нектарини) за контрол на къдравост по прасковата (*Taphrina deformans*) с доза 320-400 мл продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: От фенофаза „започва пожълтяването на листата“ до „повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици“ (ВВСН 92-59). Зимно третиране. От прибиране до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При домати и патладжан (на полето и в оранжерии) за контрол на картофена мана (*Phytophthora infestans*) с доза 240-320 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: През цялата вегетация.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 3 дни.

При домати за преработка (на полето) за контрол на картофена мана (*Phytophthora infestans*) с доза 240-320 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: Прилага се през цялата вегетация.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 10 дни.

При марули и други салати (на полето) за контрол на мана (*Bremia lactucae*) с доза 200-320 мл продукт/ дка, приложено с 50-80 л вода/дка.

Момент за приложение: През цялата вегетация.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При картофи за контрол на мана (*Phytophthora infestans*) с доза 240-320 мл продукт/дка, приложено със 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: През цялата вегетация.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При маслини за контрол на *Cycloconium oleaginum* (*Spilocaea*) с доза 320-400 мл продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: ВВСН 10-85. Едно третиране през зимата и две през пролетта.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

Разрешени минимални употреби

При лозя (винени сортове) за контрол на бактериални болести от род *Xanthomonas* с доза 240-400 мл продукт/дка, приложено със 60-100 л вода/дка. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (ВВСН 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При лозя (десертни сортове) за контрол на **бактериални болести от род *Xanthomonas*** с доза **180-360 мл продукт/дка, приложено със 60-120 л вода/дка**. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (ВВСН 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При семкови овощни видове (ябълка и круша) за контрол на **бактериални болести от род *Pseudomonas*** с доза **240-400 мл продукт/ дка, приложено със 60-100 л вода/дка**. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: ВВСН 92-59 (листата започват да пожълтяват - повечето венчелистчета оформят куха топка). Зимно третиране. След беритба до пред цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При костилкови овощни видове (праскови и нектарина) за контрол на **цитоспороза (*Cytospora leucostoma*) и сачмянка (*Coryneum spp.*)** с доза **320-400 мл продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка**. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: ВВСН 92-59 (листата започват да пожълтяват - повечето венчелистчета оформят куха топка). Зимно третиране. След беритба до пред цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При цветя и декоративни растения за контрол на ***Peronospora sp*, *Septoria sp.* и антракноза** с доза **200-400 мл продукт/ дка, приложено с 50-100 л вода/дка**.

Момент за приложение: През цялата вегетация.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При маслини за контрол на **бактериални болести от род *Pseudomonas*** с доза **320-400 мл продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка**. Само 2 приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година.*

Момент за приложение: ВВСН 10-85. Едно приложение през зимата и две през пролетта.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

Техника за приложение за всички употреби: конвенционална наземна техника.

*Поради риск за почвените организми дозата на приложение е ограничена до максимум 4,0 кг.а.в. мед/ха/година.

Указания за приготвяне на работен разтвор

Уверете се, че пръскачката е чиста и калибрирана преди употреба. Напълнете резервоара на пръскачката на половината от необходимият обем с чиста вода и включете бъркалката. Добавете необходимото количество КОДИМУР 38 ФЛО и останалата вода. Продължете да разбърквате до цялостно изпръскване на работния разтвор.

Количество вода

Осигурете достатъчно количество вода, за доброто покритие на културите. За конвенционално третиране се препоръчва да се използва минималното количество вода. При използване в оранжерии се прилага максималното количество вода, като се използва достатъчно вода, за да се осигури пълно покритие на културата.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитно работно облекло при високите култури, когато продължителността на работните задачи надвишава 2 часа след непосредствено приложение на продукта.

Да се използват лични предпазни средства - защитен гащеризон и защитни ръкавици при повторно влизане в оранжерии.

Внимание

Винаги избягвайте третиране на култури, които са подложени на стрес в момента на приложение.

Съвместимост:

КОДИМУР 38 ФЛО е съвместим с много продукти за растителна защита.

Винаги първо прочитайте етикетите на продуктите, за да се запознаете с условията за смесване и одобрените условия на употребата им. Следвайте националното законодателство относно приготвянето на резервоарни смеси.