

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

КОДИМУР 50 ВП

ФУНГИЦИД

Вид на формулацията: намокрим прах (ВП)

Активни вещества: меден оксихлорид 877,2 г/кг (Cu - 500 г/кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛ/ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

EXCLUSIVAS SARABIA S.A.

Camí de l'albí

Ptda. Rec Nou s/n

25110 Alpícat (Lleida)

Spain

Tel.: +34 973 73 73 77

Fax: +34 973 73 66 90

Email: sarabia@exclusivassarabia.com

Дистрибутор:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

Тел: 02 962 4901; www.sab.bg

Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж етикета.

Партида №: виж етикета.

Нето количество:.... L

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с Разрешение №: 01679-ПРЗ/1 – 08.03.2019 г.

Категория на употреба: втора професионална



ВНИМАНИЕ

H302: Вреден при поглъщане.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN 401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

P270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+P312: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

P330: Изплакнете устата.

P391: Съберете разлятото.

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетиране

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

Spe1: Да не се прилага този или друг продукт, съдържащ активно вещество медно съединение (Cu - мед) в доза надхвърляща 4 кг мед/хектар годишно върху една и съща площ, с цел опазване на почвообитаващите организми.

Spe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностни води или дюзи намаляващи отвяването на струята с 95%, с цел опазване на водните организми за употреба при маслини, портокали и грейпфрут.

Spe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностни води и дюзи намаляващи отвяването на струята с 50% или дюзи намаляващи отвяването на струята с 98%, с цел опазване на водните организми, за употреба при семкови и костилкови видове.

Spe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 12 метра до повърхностни води или дюзи намаляващи отвяването на струята с 90%, с цел опазване на водните организми, за употреба при лозя, винени и десертни сортове.

Spe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра до повърхностни води или дюзи намаляващи отвяването на струята със 75% с цел опазване на водните организми, за употреба при домати, патладжани, картофи и други клубеноплодни зеленчукови култури.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Защита на оператора

Да се използват защитни ръкавици и защитна респираторна маска по време на смесване/зареждане и защитни ръкавици по време на прилагане на продукта.

Да се използват защитни ръкавици и защитно работно облекло при повторно влизане с продължителност повече от два часа, непосредствено след третирането при лозя.

НОСЕТЕ ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ И ЗАЩИТА ЗА ЛИЦЕТО ПРИ РАБОТА С КОНЦЕНТРИРАНИЯТ ПРОДУКТ.

ПРИ УПОТРЕБА ДА НЕ СЕ ЯДЕ, ПИЕ ИЛИ ПУШИ.

СЛЕД КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ ОЧИТЕ, НЕЗАБАВНО ИЗМИЙТЕ ОБИЛНО С ВОДА.

НЕ ВДИШВАЙТЕ РАЗТВОРА ЗА ПРЪСКАНЕ.

ИЗМИВАЙТЕ РЪЦЕТЕ И ИЗЛОЖЕНАТА КОЖА преди хранене и след работа.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригинална опаковка, плътно затворена на безопасно място.

Първа помощ и медицински съвети

Вдишване: Изведете лицето от замърсената зона. Поставете го в покой, почти прав, с разхлабено облекло. Ако е необходимо, приложете изкуствено дишане.

Контакт с кожата: Незабавно свалете дрехите, замърсени с продукта. Измийте засегнатите зони на тялото с обилно количество вода и сапун, като избягвате триене.

Контакт с очите: Измийте очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. За да сте сигурни, че измиването е завършено, клепачите трябва да бъдат повдигнати от очната ябълка. Не забравяйте да свалите контактните лещи.

Поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Ако лицето е в съзнание, да изпие достатъчно вода, за да се разрежи продукта. Ако пострадалият е в безсъзнание, сложете го с главата по-ниско от останалата част от тялото и коленете полу свити.

Поставете пострадалият в покой. Потърсете медицинска помощ, за да се направи стомашен лаваж.

Информация за лекаря: Симптоматично лечение. Да се приложи активен въглен и лаксатив тип физиологичен разтвор (натриев, магнезиев или подобен сулфат) със специални грижи при деца и лица с чернодробни изменения. Да се следи кръвното налягане. Контрол на антабусният ефект.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

КОДИМУР 50 ВП е формулация намокрим прах, съдържаща мед под формата на меден оксихлорид. Предназначен е за предпазни третирания за контрол на болести по редица култури. Ето защо ефикасността на продукта е по – висока при добро опръскване на растенията. Спазвайте посоченият карантинен срок.

Използвайте разрешените дози от продукта и количество вода, за да осигурите цялостно покриване на растенията.

Разрешени употреби

При лозя (винени сортове) за контрол на мана (*Plasmopara viticola*) с доза **180-300 г продукт/дка**, приложено с **60-100 л вода/дка**. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „плодът е готов за беритба“ (ВВСН 13-89), при спазване на карантинният срок.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При лозя (десертни сортове) за контрол на мана (*Plasmopara viticola*) с доза **150-300 г продукт/дка**, приложено с **60-120 л вода/дка**. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „плодът е готов за беритба“ (ВВСН 13-89), при спазване на карантинният срок.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При семкови овощни видове (ябълка и круша) за контрол на струпясване (*Venturia* sp.) и нектриален рак (*Nectria galligena*) с доза **180-300 г продукт/ дка**, приложено с **60-100 л вода/дка**. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: Прилага се за зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При костилкови овощни видове (праскови, нектарина) за контрол на къдравост (*Taphrina deformans*) с доза **240-300 г продукт/ дка**, приложено с **80-100 л вода/дка**. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: Прилага се за зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При домати и патладжан (на полето) за контрол на картофена мана (*Phytophthora infestans*) с доза 180-240 г продукт/дка, приложено с 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: Прилага се от ранните стадии на развитие до 3 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 3 дни.

При домати за преработка (на полето) за контрол на картофена мана (*Phytophthora infestans*) с доза 180-240 г продукт/дка, приложено с 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: Прилага се от ранните стадии на развитие до 10 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 10 дни.

При картофи за контрол на мана (*Phytophthora infestans*) с доза 180-240 г продукт/дка, приложено с 60-80 л вода/дка.

Момент за приложение: Прилага се от ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При марули и други салатни култури (на полето) за контрол на мана (*Bremia lactucae*) с доза 150-240 г продукт/ дка, приложено с 50-80 л вода/дка.

Момент за приложение: Прилага се от ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При маслини за контрол на *Cycloconium oleaginum* с доза 240 - 300 г продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: ВВСН 10-85. Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При портокали и грейпфрут за контрол на фитофторно гниене (*Phytophthora spp.*) с доза 100 - 300 г продукт/ дка, приложено със 100-300 л вода/дка.

Момент за приложение: зимно третиране

Максимален брой приложения на година: 1.

Минимален интервал между приложенията: --.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

Разрешени минимални употреби

При лозя (винени сортове) за контрол на бактериоза (*Xanthomonas sp.*) с доза 180-300 г продукт/дка, приложено с 60-100 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „плодът е готов за беритба“ (ВВСН 13-89).

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При лозя (десертни сортове) за контрол на бактериоза (*Xanthomonas sp.*) с доза 150-300 г продукт/дка, приложено с 60-120 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: От фенофаза „третите листа са отворени“ до „плодът е готов за беритба“ (ВВСН 13-89).

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При семкови овощни видове (ябълка и круша) за контрол на бактериоза (*Pseudomonas sp.*) с доза 180-300 г продукт/ дка, приложено със 60-100 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: Прилага се за зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 7 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При костилкови овощни видове (праскови, нектарина и др.) за контрол на цитоспороза (*Cytospora leucostoma*) и сачмянка (*Coryneum spp.*) с доза 240-300 г продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: Прилага се за зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 14 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

При маслини за контрол на бактериоза (*Pseudomonas sp.*) с доза 240 - 300 г продукт/ дка, приложено с 80-100 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: ВВСН 10-85. Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При цветя и украсни видове (на полето и в оранжерии) за контрол на мана (*Peronospora sp.*), септориоза (*Septoria sp.*) и антракноза (*Colletotrichum*

gloesporoides) с доза 150 - 300 г продукт/ дка, приложено с 50-100 л вода/дка. Само 2 приложения с доза 300 г продукт/дка.

Момент за приложение: От ранните стадии на развитие до прибиране.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --.

Техника за приложение за всички употреби: конвенционална наземна техника.

Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита КОДИМУР 50 ВП за контрол на: бактериоза (*Xanthomonas* sp.) при лозя винени и десертни сортове; бактериоза (*Pseudomonas* sp.) при семкови овощни видове; цитоспороза (*Cytospora leucostoma*) и сачмянка (*Coryneum* spp.) при костилкови овощни видове; бактериоза (*Pseudomonas* sp.) при маслини; мана (*Peronospora* sp.), септориоза (*Septoria* sp.) и антракноза (*Colletotrichum gloesporoides*) при цветя и украсни видове.

Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребата на КОДИМУР 50 ВП за контрол на бактериоза (*Xanthomonas* sp.) при лозя винени и десертни сортове; бактериоза (*Pseudomonas* sp.) при семкови овощни видове; цитоспороза (*Cytospora leucostoma*) и сачмянка (*Coryneum* spp.) при костилкови овощни видове; бактериоза (*Pseudomonas* sp.) при маслини; мана (*Peronospora* sp.), септориоза (*Septoria* sp.) и антракноза (*Colletotrichum gloesporoides*) при цветя и украсни видове е на лицето прилагащо продукта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Смесване

Уверете се, че пръскачката е чиста и калибрирана преди употреба. Напълнете половината резервоар с чиста вода и включете разбъркването. Добавете необходимото количество КОДИМУР 50 ВП и останалото количество вода. Продължете да разбърквате до края на пръскането.

Количество вода

Осигурете достатъчно количество вода, за добро покритие на културите. За конвенционално третиране се препоръчва минималното количество вода. За оранжерийни култури се прилага максималното количество вода, като се използва достатъчно, за да се осигури пълно покритие на растенията.

Внимание

Винаги избягвайте третиране на култури, които са подложени на стрес в момента на прилагането.

Съвместимост

КОДИМУР 50 ВП е съвместим с много продукти за растителна защита.

Винаги първо прочитайте етикетите на продуктите които ще бъдат смесвани и следвайте одобрените условия на употреба. Следвайте националните разпоредби за приготвяне на резервоарни смеси.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третира като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Всички доставени от нас стоки са от високо качество и ние вярваме, че те са подходящи, но тъй като не можем да упражняваме контрол върху тяхното съхраняване, обработка при смесване или използване или метеорологичните условия преди, по време и след прилагането, които могат да повлияят на производителността на стоките, всички условия и гаранции, които са законови или други по отношение на качеството или годността за каквито и да е цели на нашите стоки, са изключени и никаква отговорност не ще бъде приета от нас или от дистрибуторите за неизпълнение, щета или нараняване, произтичащи от тяхното съхранение, работа, приложение или употреба. Тези условия не могат да се променят от нашия персонал или агенти, независимо дали те контролират или подпомагат използването на такива стоки.