

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

КОДИМУР СК

ФУНГИЦИД

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Активни вещества: Меден оксихлорид – 945,45 г/л (Cu – мед 520 г/л)

Производител/ Притежател на разрешението:

EXCLUSIVAS SARABIA S.A.

Camí de l'albí

Ptda. Rec Nou s/n

25110 Alpícat (Lleida)

Spain

Tel.: +34 973 73 73 77

Fax: +34 973 73 66 90

Email: sarabia@exclusivassarabia.com

Дистрибутор:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

Тел: 02 962 4901; www.sab.bg

Срок на годност: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: виж етикета.

Партида №: виж етикета.

Нето количество:.... L

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с
Разрешение №:01690 – ПРЗ 1/14.03.2019 г.

Категория на употреба: втора професионална

 ВНИМАНИЕ	H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. EUN401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P264: Да се измият ръцете старателно след употреба. P391: Съберете разлятото. P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.
--	---

Допълнително етикетиране

SP1: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

SPe1: С цел опазване на почвообитаващите организми да не се прилага този или друг продукт, съдържащ а.в. мед повече от 4 кг мед/ха/година върху една и съща площ.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностните води или дюзи редуциращи отнасянето на струята 95% с цел опазване на водните организми за употреба при портокали и грейпфрути.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 14 метра до повърхностните води или дюзи редуциращи отнасянето на струята 90% с цел опазване на водните организми за употреба при лозя винени и десертни сортове.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 25 метра до повърхностните води с 50% дюзи за намаляване на отнасянето на струята или дюзи редуциращи отнасянето на струята 98% с цел опазване на водните организми за употреба при семкови и костилкови видове.

SPe3: Да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра до повърхностните води или дюзи редуциращи отнасянето на струята 75% с цел опазване на водните организми за употреба при домати и патладжани, картофи, марули и салати.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Да се борави внимателно с контейнера съдържащ продукта, като при транспортирането му избягвайте удари с по-тежки продукти и падане.
- Преди да приложите продукта се уверете, че оборудването което ще използвате е подходящо и е в отлично състояние.
- Следвайте инструкциите за приготвяне на работен разтвор, посочени на етикета на опаковката.
- Да се инсталират в близост уреди за измиване на очите или кожата в случай на авария.
- Избягвайте контакт с кожата и вдишване на праха. Работете винаги по посока на вятъра.
- Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта.
- Свалете веднага замърсените или напоени с продукта дрехи и ги изперете с вода и сапун преди да ги използвате отново. Не оставяйте мръсни парцали, напоени с продукта в джобовете на дрехите.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте при стайна температура (избягвайте температури под 0°C и над 40°C). Двумедният хлорид трихидроксид не се разгражда по време на съхранение.

Да не се съхранява за дълъг период от време под пряка слънчева светлина.

Опаковката да се съхранява плътно затворена, на студено, сухо и проветриво място, далеч от източници на топлина, пламъци, искри или горещи повърхности.

Първа помощ и медицински съвети

Вдишване: Изведете лицето от замърсената зона. Поставете го в покой, в почти изправено положение, с разхлабено облекло. Ако е необходимо, приложете изкуствено дишане.

Контакт с кожата: Незабавно свалете дрехите, замърсени с продукта. Измийте засегнатите зони на тялото с обилно количество вода и сапун, като избягвате триене.

Контакт с очите: Измийте очите обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. За да сте сигурни, че измиването е завършено, клепачите трябва да бъдат повдигнати от очната ябълка. Не забравяйте да свалите контактните лещи.

Поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Ако лицето е в съзнание, да изпие достатъчно вода, за да се разрежи продукта. Ако пострадалият е в безсъзнание, сложете го с главата по-ниско от останалата част от тялото и коленете свити. Поставете пострадалият в покой. Потърсете медицинска помощ, за да се направи стомашен лаваж.

Информация за лекаря: Симптоматично лечение. Да се приложи активен въглен и лаксатив тип физиологичен разтвор (натриев, магнезиев или подобен сулфат). Да се следи кръвното налягане.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република

България: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

КОДИМУР СК е формулация суспензионен концентрат, съдържаща мед под формата на меден оксихлорид. Предназначен е за предпазни третирания за контрол на болести по редица култури. Ето защо ефикасността на продукта е по – висока при добро опрыскване на растенията. Спазвайте посоченият карантинен срок. Използвайте разрешените дози от продукта и количество вода, за да осигурите цялостно покриване на растенията.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

При лозя (винени сортове) за контрол на мана (*Plasmopara viticola*) с доза **180-300 мл продукт/дка**, приложен с **60-100 л/дка вода**. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (BVCH 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При лозя (десертни сортове) за контрол на мана (*Plasmopara viticola*) с доза **150-300 мл продукт/дка**, приложен с **60-120 л/дка вода**. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (BVCH 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При семкови овощни видове (ябълка, круша) за контрол на струпясване (*Venturia* sp.) и нектриален рак (*Nectria galligena*) с доза **180-300 мл продукт/дка**, приложен с **60-100 л/дка вода**. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 7 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --

При костилкови овощни видове (праскова, нектарина) за контрол на кърдавост по прасковата (*Taphrina deformans*) с доза 200-300 мл продукт/дка, приложен с 80-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --

При домати и патладжан (на полето и в оранжерии), за контрол на картофена мана (*Phytophthora infestans*) с доза 180-240 мл продукт/дка, приложен с 60-80 л/дка вода.

Момент за приложение: От ранните стадии на развитие до 3 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 3 дни

При домати за преработка (на полето), за контрол на картофена мана (*Phytophthora infestans*) с доза 180-240 мл продукт/дка, приложен с 60-80 л/дка вода.

Момент за приложение: От ранните стадии на развитие до 10 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 10 дни

При картофи за контрол на мана (*Phytophthora infestans*) с доза 180-240 мл продукт/дка, приложен с 60-80 л/дка вода.

Момент за приложение: От ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни.

При марули и салати (на полето), за контрол на мана (*Bremia lactucae*) с доза 150-240 мл продукт/дка, приложен с 50-80 л/дка вода.

Момент за приложение: От ранните стадии на развитие до 15 дни преди прибиране на реколтата.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При маслини за контрол на *Cycloconium oleaginum* с доза 240-300 мл продукт/дка, приложен с 80-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. При 3 приложения да се прилага с ниската доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От развитие на листа до узряване на плода (BVCH 10-85). Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При портокали и грейпфрут за контрол на **фитофторно гниене (*Phytophthora sp.*)** с доза 100-300 мл продукт/дка, приложен с 100-300 л/дка вода.

Момент за приложение: Зимно третиране

Максимален брой приложения на година: 1

Минимален интервал между приложенията: --

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ

При лозя (винени сортове) за контрол на **бактериоза (*Xanthomonas sp.*)** с доза 180-300 мл продукт/дка, приложен с 60-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (BVCH 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При лозя (десертни сортове) за контрол на **бактериоза (*Xanthomonas sp.*)** с доза 150-300 мл продукт/дка, приложен с 60-120 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От „третите листа са отворени“ до „зърната формират цвят“ (BVCH 13-83).

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При семкови овощни видове (ябълка, круша) за контрол на **бактериоза (*Pseudomonas sp.*)** с доза 180-300 мл продукт/дка, приложен с 60-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 7 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --

При костилкови овощни видове (праскова, нектарина) за контрол на цитоспороза (*Cytospora leucostoma*) с доза 200-300 мл продукт/дка, приложен с 80-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: Зимно третиране. След прибиране на реколтата до преди цъфтеж.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --

При маслини за контрол на бактериоза (*Pseudomonas sp.*) с доза 240-300 мл продукт/дка, приложен с 80-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. При 3 приложения да се прилага с ниската доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От развитие на листа до узряване на плода (BBCH 10-85). Едно приложение през зимата и две приложения през пролетта.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 10 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: 15 дни

При цветя и украсни видове (на полето и в оранжерии), за контрол на мана (*Peronospora sp.*), септориоза (*Septoria sp.*) и антракноза, *Venturia sp.* с доза 150-300 мл продукт/дка, приложен с 50-100 л/дка вода. Само две приложения с високата доза. Максимум 4 кг мед/ха/година*.

Момент за приложение: От ранните стадии на развитие до прибиране.

Максимален брой приложения на година: 3

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: --

Техника за приложение за всички употреби: Конвенционална наземна техника.

*Поради риск за почвените организми дозата на приложение е ограничена до максимум 4 кг мед/ха/година.

Забележки:

1. Българска агенция по безопасност на храните не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от прилагането на продукта за растителна защита КОДИМУР СК за разрешените минимални употреби.
2. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата на КОДИМУР СК за разрешените минимални употреби е на лицето прилагащо продукта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Смесване

Уверете се, че пръскачката е чиста и калибрирана преди употреба. Напълнете половината резервоар за пръскане с чиста вода и включете разбъркването. Добавете необходимото количество КОДИМУР СК и останалата вода. Продължете да разбърквате до края на пръскането.

Количество вода

Да се използва подходящо количество вода, за добро покритие на културите. За конвенционално третиране се препоръчва използването на минималното количество вода. За оранжерийни култури продуктът се прилага с максималното количество вода, за да се осигури пълно покритие на растенията.

Внимание

Винаги избягвайте третиране на култури, които са подложени на стрес в момента на прилагането.

Съвместимост

КОДИМУР СК е съвместим с много продукти за растителна защита.

Винаги първо прочитайте етикетите на продуктите предназначени за смесване и следвайте одобрените условия на употреба. Следвайте националните разпоредби за приготвяне на резервоарни смеси.

Несъвместими продукти:

Несъвместим с продукти, съдържащи живак, полисулфид, циановодородна киселина или активни съставки със силна киселинна или алкална реакция. Контактът с алкални вещества води до тяхното разпадане до медни оксиди и хлороводород.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Всички доставени от нас стоки са с високо качество и ние вярваме, че те са подходящи, но тъй като не можем да упражняваме контрол върху тяхното съхраняване, обработка при смесване или използване или метеорологичните условия преди, по време и след прилагането, които могат да повлияят на производителността на стоките, всички условия и гаранции, които са законови или други по отношение на качеството или годността за каквито и да е цели на нашите стоки, са изключени и никаква отговорност не ще бъде приета от нас или от дистрибутори за неизпълнение, щета или нараняване, произтичащи от тяхното съхранение, работа, приложение или употреба. Тези условия не могат да се променят от нашия персонал или агенти, независимо дали те контролират или подпомагат използването на такива стоки.