

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ДЕЛМУР

Пиретроиден инсектицид с широк спектър на действие за контрол на вредители при редица култури

ГРУПА ЗА ИНСЕКТИЦИД

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с **Разрешение №: 01992-ПРЗ/1-12.11.2021 г.**

Функция на продукта: Инсектицид

Съдържание на активно вещество: Делтаметрин - 25 г/л

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: Непрофесионална

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство:.....

Партида №:.....

Нето количество:.... L

Притежател на разрешението:

EXCLUSIVAS SARABIA, S.A.

Camí de l'Albí- Ptda Rec Nou s/n Alpicat (Lleida),

Испания

Дистрибутор:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

Тел: 02 962 4901; www.sab.bg



Внимание

Предупреждения за опасност:

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P391 Съберете разлятото.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

Допълнително етикетиране:

SP 1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи отвяванията с 90% при семкови овощни култури и бадем, 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи отвяванията с 95% при картофи, лозя, листни зеленчуци и памук, 20 метра с включена 20 метра растителнозащитна ивица и дюзи намаляващи отвяванията с 50% при луковични и плодни зеленчукови култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

SPe 3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 30 метра с включени дюзи намаляващи отвяванията с 90% при семкови овощни култури и бадем, 15 метра с включени дюзи намаляващи отвяванията с 90% при лозя, 10 метра с включени дюзи намаляващи отвяванията с 75% при зеленчуци до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране.

SPe 8 Опасен за пчелите. Да не се прилага при култури в периода на цъфтеж с цел опазване на пчелите и други насекоми опрашители. Да не се използва, където има активна паша на пчели. След третиране пчелите трябва да останат в кошера си поне 1 ден, с достатъчно храна и вода или да си върнат обратно, но на не по-малко от 3 км разстояние. Да не се прилага при наличие на цъфтяща плевелна растителност. Плевелите да се премахнат преди цъфтежа им.

Да се носят защитни ръкавици и предпазни средства за очите/лицето при работа и прилагане на продукта.

Първа помощ и медицински съвети:

Вдишване: Преместете експонираното лице от района на чист въздух; поддържайте пострадалото лице топло и в покой. Ако дишането е затруднено или спира, направете изкуствено дишане.

Контакт с очите: Премахнете контактните лещи, ако има такива и ако е лесно да се направи. Измийте очите обилно с чиста и хладка вода в продължение на най-малко 10 минути, като държите клепачите отворени. Да се потърси медицинска помощ. Не позволявайте на пострадалото лице да търка засегнатото око.

Контакт с кожата: Отстранете замърсените дрехи. Измийте енергично кожата с вода и сапун или подходящ препарат за почистване на кожата. НИКОГА не използвайте разтворители или разреждатели.

Поглъщане: При случайно поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. НИКОГА не предизвиквайте повръщане.

Информация за лекаря:

Симптоми: блокира нервното предаване чрез хиперстимулиране на пре-пост синаптични нервни окончания. Особена чувствителност от пациенти, които са алергични и астматични, както и от деца. Симптоми на ЦНС: треперене, конвулсии, атаксия; дразнене на дихателните пътища: ринорея, кашлица, бронхоспазм и диспнея; алергични реакции, предизвикващи: анафилаксия, хипертермия, изпотяване, оток на кожата, периферен съдов колапс. Терапия: симптоматично и реанимация. Забележка: Разредители (въгледороди) могат да причинят химична бронхопневмония, сърдечни аритмии.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Описание на продукта:

ДЕЛМУР е широкоспектърен инсектицид, който действа при контакт и чрез поглъщане. Има бързо нокдаун действие и позволява достатъчно дълготрайна растителна защита с голяма сигурност при употреба. Продуктът се използва само на полето и се прилага при поява на насекомите, освен ако не е посочено друго.

Разрешени употреби:

Семкови овощни култури (ябълка, круша, японски мушмули, мушмули, дюля, круши „Наши“) за контрол на листни въшки: Зелена ябълкова листна въшка (*Aphis pomi*), Черна бобова листна въшка (*Aphis faba*), Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), Кръвна въшка (*Eriosoma lanigerum*), картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*), Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), Ябълково-житна листна въшка (*Rhopalosiphum insertum*), Ябълково-живовлекова листна въшка (*Dysaphis plantaginea*), Зелена цитрусова листна въшка (*Aphis spiraecola*), **Ларви на:** Ябълков плодов червей (*Cydia pomonella*), Средиземноморска плодова муха (*Ceratitis capitata*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено със 100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза „миши уши“ (ВВСН > 10). При спазване Закона за пчеларството - да не се прилага по време на цъфтеж на културите (ВВСН 60-69) и плевелите.

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 7 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При лозя (десертни и винени сортове) за контрол на шарен гроздов молец (*Lobesia botrana*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 80-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза отваряне на първия лист (ВВСН > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 7 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При картофи за контрол на **колорадски бръмбар** (*Leptinotarsa decemlineata*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 60-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза нарастване на първите листенца от клубените (BVCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 7 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При домати и патладжан (на полето) за контрол на **листни въшки:** Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), Картофена листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*), Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), **ларви на:** видове от род *Heliothis* (*Heliothis* sp.), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Точкова нощенка (*Chrysodeixis chalcites*), Доматен миниращ молец (*Tuta absoluta*), Зимна нощенка (*Agrotis segetum*), Гамозначна нощенка (*Autographa gamma*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза пълно разтваряне на котиледоните (BVCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При тиквички (на полето) за контрол на **листни въшки:** Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), **ларви на:** Гамозначна нощенка (*Autographa gamma*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза пълно разтваряне на котиледоните (BVCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При краставици и корнишони (на полето) за контрол на **листни въшки:** Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), Листна въшка по марулата и салатата (*Hyperomyzus lactucae*), **ларви на:** Ипсилонова нощенка (*Agrotis ipisilon*), Зимна нощенка (*Agrotis segetum*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Нощенки (*Spodoptera* sp.), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза пълно разтваряне на котиледоните (BVCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При пъпеш (на полето) за контрол на **листни въшки:** Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), **Ларви на:** Гамозначна нощенка (*Autographa gamma*), Подземни нощенки (*Agrotis* sp.), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), Ипсилонова нощенка (*Agrotis ipsilon*), Зимна нощенка (*Agrotis segetum*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза пълно разтваряне на котиледоните (BVCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При дини (на полето) за контрол на **листни въшки** Памукова листна въшка (*Aphis gossypii*), Зеленоивичеста листна въшка (*Macrosiphum euphorbiae*), **ларви на:** Гамозначна нощенка (*Autographa gamma*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза пълно разтваряне на котиледоните (BVCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

Разрешени минимални употреби*:

При бадем за контрол на **листни въшки** (*Mizus* sp.), Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено със 100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза отделяне на първите листа: светлозелените люспи са леко отворени и откриват листата (BVCH > 10). При спазване на Закона за пчеларството -да не се прилага по време на цъфтеж на културите (BVCH 60-69) и плевелите.

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 30 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При артишок за контрол на **ларви на:** Египетска памукова нощенка (*Spodoptera littoralis*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза BBCH > 10.

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При ягоди (на полето) за контрол на листни въшки: Памукова листна въшка (*Aphids gossypii*), Листна въшка (*Aphis ruborum*), Оранжевий картофена листна въшка (*Aulacorthum solani*), Бяла ягодова листна въшка (*Chaetosiphon fragaefolii*), Зелена прасковена листна въшка (*Myzus persicae*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза поява на първи лист (BBCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При памук за контрол на розов червей по памука (*Pectinophora gossypiella*), Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Тютюнева белокрылка (*Bemisia tabaci*), Лозова цикадка (*Empoasca* spp.), Нощенки (*Spodoptera* spp.), Памукова листна въшка (*Aphids gossypii*), Подземни нощенки (*Agrotis* spp.), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка. **Продукцията да се използва само в текстилната промишленост. Семената от третирания памук да не се използват за храна и фураж.**

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза напълно разтворени котиледони (BBCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: Не се изисква.

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При лук, праз и чесън (на полето) за контрол на Подземни нощенки (*Agrotis* spp.), Зимна нощенка (*Agrotis segetum*), Тютюнев трипс (*Trips tabaci*), в доза на приложение 50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза ясно видим първи лист (BBCH > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 7 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

При марули, компасна салата, спанак (на полето) за контрол на Памукова нощенка (*Helicoverpa armigera*), Малка полска нощенка (*Spodoptera exigua*) Сребристоточкова нощенка (*Crathichneumon chalcites*), Листни въшки по марулята и салатата (*Hyperomyzus lactucae* и *Nasonovia ribisnigri*), Подземни нощенки (*Agrotis* spp.), в доза на приложение

50 мл продукт/дка, приложено с 30-100 л количество вода/дка. Третираната компасна салата да не се използва за храна.

Момент за приложение: При поява на неприятеля, след фенологична фаза напълно развити котиледони (ВВСН > 10).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника.

***Забележки:**

Българската агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДЕЛМУР срещу разршените минимални употреби на продукта.

Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или проявена фитотоксичност при употребите на ПРЗ ДЕЛМУР срещу разршените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

Приготвяне на работния разтвор и пръскане:

Разредете посочената доза ДЕЛМУР в малко вода, изсипете в резервоара на пръскачката и долейте резервоара до необходимото количество вода, като бъркате. Посочените дози се отнасят за третиране с нормален обем вода. При третиране с малък обем увеличете концентрацията пропорционално на намаляването на обема на водата, така че да поддържате същата доза от продукта на декар. ДЕЛМУР действа чрез контакт и поглъщане. Ето защо е необходимо да се извърши много внимателно третиране, като се гарантира, че намокрянето е възможно най-равномерно по цялата растителна повърхност. При растения, които са трудни за намокряне, се препоръчва добавянето на омокрящ агент. За да осигурите най-добрата ефективност на третирането, третирайте рано, преди насекомото да навлезе в растението или да накара листата да се извият. Предупреждение: В случай на смесване с други формулации, трябва да се спазва най-дългия период на изчакване. Трябва също да се спазват предпазните мерки, предписани за най-токсичните продукти. Когато се установят случаи на отравяне, информирайте лекаря за извършеното смесване. Да се прилага когато няма вятър.

Съхранение:

Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

ВНИМАНИЕ

Да се използва изключително за целите и при условията, предвидени в този етикет. Лицата, които използват продукта, са отговорни за евентуални щети, които могат да произтичат от неправилна употреба на препаратa. Спазването на всички указания, съдържащи се в настоящия етикет, представлява съществена предпоставка за гарантиране на ефективността на третирането и за предотвратяване на щети по растенията, хората и животните.