

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ФЛОНТ

ГРУПА 1 ХЕРБИЦИД



ОПАСНО

Предупреждения за опасност:

H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

H361d: Предполага се, че уврежда плода.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P261 Избягвайте вдишване на дим/изпарения/аерозоли.

P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ / на лекар.

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетирание:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe2 Да не се прилага на повече от 30% от площта, за употребата при ябълки, с цел опазване на подпочвените води.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

UFI: 413G-RXMF-2A0H-49RY

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: флуазифоп-П 125 г/л

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешение за употреба № 01920-ПРЗ/17.03.2021 г.

Описание на продукта и механизъм на действие: ФЛОНТ е системен хербицид на базата на флуазифоп-П за контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, след поникването им. Флуазифоп-П принадлежи към химическата група на арилоксифенокси-пропионатите „FOPs“ (HRAC група 1).

ФЛОНТ се абсорбиран през листата и блокира синтеза на липиди (инхибиране на ацетил КоА карбоксилаза) и бързо спира растежа.

Третирането да се извърши когато плевелите са в активен растеж, култура е в добро състояние, времето е меко и влажност на въздуха е висока.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

- **патладжан (на полето)** за контрол на едногодишни житни плевели в доза **150 мл продукт/дка**
- **слънчоглед, захарно и фуражно цвекло** за контрол на едногодишни житни плевели в доза **150 мл продукт/дка** и на многогодишни житни плевели в доза **300 мл продукт/дка**
- **ябълки** за контрол на едногодишни житни плевелни видове в доза **200 мл продукт/дка**

Приложение в реда, да не се прилага върху повече от 30% от повърхността на площта. Ябълките да се прибират единствено от дървото, като не се допуска замърсяване на плодовете чрез контакт с почвата.

- **маслини** за контрол на едногодишни житни плевели в доза **200 мл продукт/дка**
- Маслините да се прибират единствено от дървото, като не се допуска замърсяване на плодовете чрез контакт с почвата.

РАЗРЕШЕНА МИНИМАЛНА УПОТРЕБА

- **патладжан (на полето)** за контрол на многогодишни житни плевели в доза **250 мл продукт/дка.**

Забележка:

1. *Българска агенция по безопасност на храните не носи никаква отговорност за каквато и да е липса на ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ФЛОНТ при патладжан за контрол на многогодишни плевели.*
2. *Отговорността за липса на каквато и да е ефикасност или проявена фитотоксичност от приложението на продукта за растителна защита ФЛОНТ при патладжан за контрол на многогодишни житни плевели е на лицето, прилагащо продукта.*

Техника на приложение: пръскане с механизизирана наземна техника.

Момент за приложение: при едногодишни плевели – 1-3 листа (за плевелите); при многогодишните плевели – в активен растеж на плевелите (10-50 см височина), до 25 см височина за балура.

Максимален брой приложения на година за култура: 1

Количество работен разтвор: 20-60 литра вода/дка

Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата: патладжан - 35 дни, захарно и фуражно цвекло - 56 дни, слънчоглед - 90 дни, ябълки и маслини - 28 дни

Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ: 48 часа

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

Едногодишни плевели: издънкова полевица (*Agrostis stolonifera*), италиански райграс (*Lolium multiflorum*), видове овес (*Avena* sp.), видове овсига (*Bromus* sp.). кокоше просо (*Echinochloa crus-galli*), видове кощрява (*Setaria* sp.), полска лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*).

Многогодишни плевели: обикновен тростот (*Cynodon dactylon*), пълзящ пирей (*Agropyron repens*), балур (*Sorghum halepense*).

Управление на резистентността: Многократната употреба на една и съща площ на хербициди, с активно вещество с еднакъв механизъм на действие може да доведе до появата на устойчиви плевели. За да се намали този риск, се препоръчва да се редуват продукти, с различен механизъм на действие и прилагането и на други практики за борба с плевелите, като сеитбообръщение.

Указания за приготвяне на работния разтвор: Напълнете $\frac{3}{4}$ от обема на резервоара с чиста вода. Включете бъркалката и добавете разрешената доза ФЛОНТ. Допълнете останалата вода и разбъркайте старателно. Не изключвайте бъркалката по време на пръскане и спиране. Използвайте работния разтвор веднага след приготвяне.

Съвместимост: Резервоарните смеси трябва да се използват в съответствие с действащите разпоредби.

Инструкции за безопасност: Да се използват лични предпазни средства – ръкавици и гащеризон по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта. По време на работа с продукта, да не се яде, пие и пуши и да не се ползва телефон. При третирането, да се предотврати отвяване на разтвора и попадане върху съседни култури или водни площи. Да се прецени дали пръскачката е подходяща за предвиденото приложение, дали е добре настроена и да се следи за отвяване на разтвора. Да не се замърсяват подпочвени и повърхностни води по време на смесване, пръскане или почистване на опаковките и пръскачката.

Защита на оператора и работника

Оператор, облекло: нитрилни ръкавици; работен гащеризон, с водоотблъскваща повърхност; полумаска за лице с филтър РЗ; предпазни очила EN 166

Работник, облекло: работен гащеризон, с водоотблъскваща повърхност

Първа помощ и медицински съвети: Стойте далеч от опасната зона.

При контакт с кожата: свалете замърсеното облекло, Незабавно измийте кожата обилно с много вода. При дразнене или обрив се консултирайте със специалист.

При контакт с очите: Измийте веднага с много вода в продължение на най-малко 15 минути, като държите очите отворени и потърсете лекарска помощ.

При вдишване: В случай на затруднено дишане. Извадете пострадалия от замърсената зона на чист въздух. Веднага се обадете на телефон 112 или Клиника по токсикология.

При поглъщане: Незабавно изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане без лекарска консултация. Незабавно се обадете на телефон 112 или Клиника по токсикология. Във всички случаи, ако симптомите продължават или чувствате неразположение, потърсете медицинска помощ и покажете на лекаря етикет и / или информационен лист за безопасност.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Р. България: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов": Тел. +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение: Да се съхранява в оригинален, плътно затворен контейнер, на хладно и проветриво място, далеч от храни, напитки и фуражи. Да се съхранява на безопасно място, недостъпно за деца и неоторизирани лица.

Почистване на техниката за приложение: Изплакнете старателно оборудването за пръскане, за да избегнете риск от увреждане на културите при следваща употреба на пръскачката. Отпадните води от почистването да се изхвърлят в съответствие с действащите разпоредби.

Унищожаване на отпадъци от продукта: Празната опаковка да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да не се използват повторно за каквито и да било цели. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да не се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, да се третира като опасен отпадък и да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от ЗУО.

Притежател на разрешението: Sharda Cropchem España S.L., Spain

Производител: Sharda Cropchem Ltd., India

Дистрибутор: Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

Тел: 02 9624901 Факс: 02 9624876

Срок на годност: 2 години

Дата на производство: виж маркировката

Партида №: виж маркировката

Нето количество: 5 л