

ИЗОМЕЙТ® - OFM TT

ISOMATE®- OFM TT

ФЕРОМОНОВ ДИСПЕНСЕР ЗА КОНТРОЛ ЧРЕЗ МЕТОДА НА ПОЛОВА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ НА ПЕПЕРУДИТЕ НА ИЗТОЧЕН ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО ПРАСКОВИ, КАЙСИИ, ЯБЪЛКИ, КРУШИ, ДЮЛИ И СЛИВИ И СЛИВОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ ПО СЛИВИ

СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ

ИЗОМЕЙТ®-OFM TT е феромонов диспенсер за контрол чрез метода на полова дезориентация на пеперудите на:

- източен плодов червей (*Cydia molesta*) в праскови, кайсии, ябълки, круши, дюли и сливи
- сливов плодов червей (*Cydia funebrana*) в сливи

Освобождаването на феромон във въздуха в градината дезориентира мъжките пеперуди и пречи на копулацията, в резултат на което се прекъсва биологичния цикъл на развитие на инсектите преди появата на вредящата форма.

■ Състав:

Z-8-додеценил ацетат: 822 г/кг

E-8-додеценил ацетат: 43 г/кг

Z-8-додеценол: 9 г/кг.

■ Формулация: ВП (продукт отделящ пари)

■ Разрешение за пускане на пазара и употреба №: 1273-ПРЗ / 01.12.2014 г.

Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

Производител: Шин-Етсу Кемикъл Ко Лтд, Япония

Култура	Неприятел	Доза *
праскови	Източен плодов червей	25 диспенсера / дка *
кайсии	Източен плодов червей	25 диспенсера / дка *
ябълки	Източен плодов червей	25 диспенсера / дка *
круши, дюли, наши (азиатски круши)	Източен плодов червей	25 диспенсера / дка *
сливи	Сливов плодов червей	30 диспенсера / дка *
сливи	Източен плодов червей	30 диспенсера / дка *

* Виж инструкциите относно приложението на допълнителни диспенсери за подсилване на контрола в краищата на градината.

ИЗОМЕЙТ®-OFM TT може да се прилага при биологично производство.



ВНИМАНИЕ

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

EUN 066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

EUN 401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

P273: Да се избягва изпускане в околната среда

P280: Използвайте предпазни ръкавици

P501: Съдържанието/съдът да се унищожи в сертифицирана инсталация за преработка на отпадъците

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.

UFI : YXK3-70U7-J00H-RUQ4

СЪХРАНЕНИЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Съхранявайте диспенсерите в оригинални запечатани опаковки, в хладни и сухи помещения, предпазени от светлина. За по-продължително съхранение, температурата не трябва да превишава 5°C. Унищожаването на празните опаковки и празните диспенсери да се извършва в съответствие с действащите разпоредби.

ВАЖНО – Спазвайте посочените на опаковката указания за употреба, дози, условия и мерки за безопасност, които са изготвени на база на характеристиките на продукта и предвидените употреби. Грижете се за културата и третираната в съответствие с добрите земеделски практики, вземайки предвид и под ваша отговорност всички конкретни фактори относно вашата градина като почвен тип, климатични условия, земеделски практики и обработки, сортове, резистентност на видовете... Производителят гарантира качеството на своите продукти, продадени в техните оригинални опаковки, също както и тяхното съответствие с регистрацията одобрена от Министерство на земеделието. Имайки предвид разнообразието на съществуващите законодателства, е препоръчително, в случай на планиран износ на продукция, произведена от площи третирани с този продукт, да се проверят действащите разпоредби в съответната страна.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Третираната площ трябва да бъде с компактна форма и с **минимална площ от 10 дка, в случай на употреба за контрол на Източен плодов червей по праскови и кайсии и 30 дка при употреба в другите култури – ябълки, круши, дюли, азиатски круши, сливи**. Потенциалното ниво на нападение трябва да е умерено и в околните площи не трябва да има места със силно нападение. Когато е възможно, площите опазвани чрез метода на полова дезориентация с ИЗОМЕЙТ®-OFM ТТ трябва да бъдат колкото е възможно по-големи, а не ограничени до една градина, както е при другите третираня.

❶ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Методът на контрол е изцяло предпазен и е от особена важност диспенсерите да се инсталират **преди началото на летежа на целевия неприятел** (източен плодов червей и сливов плодов червей). Инсталирането на диспенсерите ИЗОМЕЙТ®-OFM ТТ е еднократно за сезон.

- Спазвайте препоръчаната доза на приложение. Диспенсерите се инсталират разпределени равномерно из целия парцел, разположени шахматно ред спрямо ред, **в горната 1/3 от височината на дървото**, на двугодишна дървесина.

Използвайте адаптираното приспособление за инсталиране на диспенсерите на дърветата.

- **Подсилете защитата по границите на парцела** чрез удвояване плътността на диспенсерите в крайните редове и на последните 4 до 5 дървета в края на всеки ред. Инсталирайте диспенсери и на живи плетове или ветрозащитни пояси, на изолирани потенциално нападнати дървета в близост до градината и на местата с липсващи дървета в самия парцел.

В случай, че съседни градини са нападнати от целевия неприятел (източен плодов червей или сливов плодов червей) и не се опазват чрез метода на полова дезориентация, тогава е необходимо да се осигури най-малко 30 м буферна зона, която да се опазва едновременно чрез инсталиране на диспенсери и третиране с инсектициди.

Ако в близост до третирания парцел има места нападнати от целевия неприятел, тогава е възможно оплодени женски да мигрират от тези места, да навлязат в парцела и да повлияят на резултатите. Такива места могат да бъдат: лошо опазвани градини, изоставени градини, единични дървета от видове, които е вероятно да бъдат колонизирани от целевия неприятел.

❷ ПРОСЛЕДЯВАНЕ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ

Необходимо е да се следи за правилното функциониране на метода и отсъствието на каквито и да е нарушения свързани със средата извън парцела. Поради тази причина, след приложението, на определени интервали (на всеки 1 до 2 седмици, в зависимост от рисковите периоди) **е необходимо да се извършва:**

- проверка на феромоновите уловки (за целевия неприятел и други възможно налични неприятели от р. Lepidoptera)
- периодичен контрол на леторастите (за Източен плодов червей) по 50 до 100 дървета
- периодичен контрол на плодовете, 500 до 1000 плода (в най-рисковите зони като краищата на градината, върховете на дърветата, допиращи се плодове, дървета близо до зони с нападение извън градината). Проверявайте с особено внимание през периодите на висока атрактивност на плодовете за неприятеля и в края на сезона за опасности от прехвърляне на популация (от райони с други сортове или култури с по-ранна беритба).

❸ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНСЕКТИЦИДИ

■ В праскови: През първата година на приложение на метода на полова дезориентация или в случай на липса на сигурна информация относно нивото на нападение в предходната година, е препоръчително да се направи допълнително приложение на инсектицид срещу първо поколение на Източния плодов червей.

■ Срещу целевият неприятел (Източен плодов червей или Сливов плодов червей): Може да се наложи приложение на база на развитие на популацията **отчетено в рамките на периодичния контрол**, в случай на отчитане на уловени пеперуди (даже на малък брой) във феромоновите уловки в парцела с приложение на метода на полова дезориентация и в случай на отчитане на симптоми на нападение по леторастите или плодовете.

■ Срещу други неприятели: да се прилага подходяща програма за опазване, обхващаща видовете, които не се контролират чрез ИЗОМЕЙТ®-OFM ТТ.

Притежател на разрешението:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

Производител:

Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.Tokyo, Japan

Лице, което пуска на пазара:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
тел: 02 / 962 4901; факс: 02 / 962 4876

Съдържание:

Опаковка съдържаща **200 диспенсера**