

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ЛИМАТАК

За борба с голи и градински охлюви в полски култури, зеленчуци, овощни култури, цветя и декоративни растения и оранжерийни култури

Внимание

UFI : 8200-3050-400Q-UCYV



Предупреждения за опасност: H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

Препоръки за безопасност: P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции; P202 Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност; P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло; P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ; P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

Допълнително етикетирание: EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Други елементи на етикета: SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища); SPe6 Да се отстранят разпилените количества с цел опазване на птиците/дивите бозайници.

Активно вещество: 40 г/кг металдехид

Функция на ПРЗ: лимацид (молюскоцид)

Вид формулация: гранулирана примамка (ГБ)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за употреба в Р. България със **Заповеди РД 11-1761/10.11.2014 г. и РД 11-3048/14.12.2021 г.** на изпълнителния директор на БАБХ и **Разрешение № 01266-ПРЗ-2/21.04.2015 г.**

Област на приложение на продукта:

Употребя: Ядливи и неядливи култури

ЗА УПОТРЕБА САМО КАТО ЛИМАЦИД (МОЛЮСКОЦИД) В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО / ГРАДИНАРСТВО

Максимална доза на приложение:

- 0,5 кг/дка при площно разхвърляне или редово приложение
- 0,4 кг/дка при приложение в браздата или смесване със семената

Максималната обща доза за всички приложения не трябва да надвишава 1,75 кг продукт/дка за култура/вегетационен период.

Когато има доказателство за висока активност на неприятелите, използвайте цялата доза.

Максимален брой приложения: максимум 4 приложения през интервал от минимум 5 дни

Карантинен срок: картофи: 7 дни преди прибиране; ново пасище (райграс): да се изчака не по-малко от 49 дни преди да се пуснат животни на паша в третираните площи; за всички останали култури – карантинния срок се определя от последното приложение съгласно разрешените употреби.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура	Максимална доза- кг/дка	Момент на приложение	Начин на приложение
Ягоди (на полето и в оранжерии); Семкови, костилкови, черупкови овощни видове, Цитрусови култури; Лозя – винени и десертни , Ягодоплодни култури – къпини, малини, боровинки, касис	0,5	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 69 – край на цъфтежа	Площно (разхвърляне) или редово приложение
Картофи	0,5	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 97 – листата и стъблата загиват, стъблата покафеняват и загиват	Площно приложение (разхвърляне)
Карфиол, броколи, главесто зеле, брюкселско зеле		от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 41 – начало на формиране на главите- двата най-млади листа не са разтворени	
Марули и други салати, спанак и подобни, подправки – магданоз (на полето и в оранжерии)		от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 41 – начало на формиране на главите- двата най-млади листа не са разтворени за марули, салати / образувана 10% от листната маса характерна за вариетета за спанак, магданоз и др. подправки	
Грах , фасул, леща		от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 15 – пети същински лист разтворен	
Артишок		от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 51 видими цветни пъпки	
Цветя и декоративни култури (на полето и в оранжерии)		от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 99 – прибрана продукция	
Захарно цвекло, фуражно цвекло, салатно цвекло, крмно цвекло, ряпа	0,5	от ВВСН 00 ¹ до не по-късно от ВВСН 15 – разлистени 5 листа	Браздово или площно (разхвърляне)
Маслодайни култури с изключение на фъстъци	0,4	ВВСН 00 ¹	Браздово приложение при сеитба или смесване със семената
	0,5	от ВВСН 00 ¹ до не по-късно от ВВСН 17 – разтворен седми лист	Площно приложение (разхвърляне)
Пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале	0,4	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 29 край на братене	Смесване със семената
	0,5	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 29 край на братене	Площно приложение (разхвърляне)
Царевица, сладка царевица, просо, сорго	0,4	ВВСН 00 ¹	Браздово приложение при сеитба
	0,5	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 15 - разтворени 5 листа	Площно приложение (разхвърляне)
Ново пасище (райграс)	0,5	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 15 - разтворени 5 листа	Смесване със семената или площно приложение (разхвърляне)
Тревни площи	0,4	ВВСН 00 ¹	Смесване със семената
	0,5	от ВВСН 00 ¹ до ВВСН 99 – прибрана продукция	Площно приложение (разхвърляне)

(1) От 7 дни преди сеитба / засаждане

Начин на приложение

Пелетите ЛИМАТАК може да се прилагат ръчно или механизирано.

Приложението чрез разхвърляне осигурява най-добри резултати. Това се отнася до използването на разпръсквачка с въртящи се дискове.

Локализирано приложение може да се прави при сеитба / редова сеитба по следните два метода:

- Приложението на пелетите се извършва посредством семепроводните тръби на сеялката в браздата

- Пелетите се смесват със семената

Ако се прилага чрез смесване със семената, пелетите и семената трябва да се смесят много добре преди и по време на приложението.

Ръчното приложение е подходящо особено когато площта, която ще се третира е малка, при оранжерийни култури и/или при приложение в реда.

Интервали и брой приложения

Интервал между приложенията: минимум 5 дни.

а) до 7 дни преди сеитба/засаждане: позволени са 1 или 2 приложения.

б) по време на сеитба: позволява се едно разхвърляне, браздово приложение или смесване със семената.

с) преди и след поникване: позволени са няколко приложения, до максималната допустима доза от 1.75 кг/дка/култура на година (с включени всички приложения)

ЛИМАТАК проявява силна устойчивост на атмосферни условия. Следващо третиране може да се наложи особено когато пелетите са изядени или при нова поява на вредители.

Момент на приложение

Относно момента на приложение трябва да се вземе предвид:

- Откриване на вредители или вероятна дейност
- Частта на културата обект на нападение от неприятеля: специфичната стратегия ще се определи от това дали се нападат семената, растенията или подземната част на растението.

Най-добри резултати се постигат, когато третиранията се извършват преди да възникне повредата. Едногодишните култури е препоръчително да се третират преди поникване. Приложете продукта след като е завършена подготовката на лехите.

За контрол на охлювите е важно да се третира преди вредителите да се покачат на културата. ЛИМАТАК съдържа горчив агент.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Ограничения / Предупреждения

Максималната обща доза не трябва да надвишава 1,75 кг/дка продукт за култура и на година.

Продуктът е отровен за домашни животни. Дръжте домашните животни далече.

Да не се поставя на купчинки. Незабавно изметете и премахнете разпилените пелети.

Повторни третираня се препоръчват при условия на високо нападение от охлюви.

Контрол на охлюви

Начин на действие

При контрола с примамки се разчита на това, че примамката ще бъде частично или изцяло изядена от неприятеля. Поради което, голите и градинските охлюви първо трябва да намерят примамката, преди да я изядат.

Погълнатото количество е ключов фактор за ефикасността: привлекателността на пелетите трябва да е достатъчно добра, за да провокира поемане на летална доза.

Пелетите ЛИМАТАК причиняват обездвижване на охлювите. Следва смърт. Най-добри резултати се постигат когато се прилагат при леко влажно време, когато охлювите са най-активни.

Примамките на De Sangosse представляват качествено нова формулация, която се характеризира с по-бързо разпространение в организма на неприятеля и поради това и по-оптимална ефикасност на активното вещество.

Мониторинг на популацията

С цел да се направи оценка на риска от увреждане на културите, от съществено значение е да се извършват преки или косвени наблюдения.

С цел да се следи популацията на вредителите, препоръчително е използването на специално предназначени уловки. Това позволява количествена оценка на популацията на вредителите и оценка на риска за културата.

Мониторингът трябва да започне възможно най-рано (преди засяване или засаждане) и да продължи през чувствителните фази на развитие на културите.

Също така трябва да се концентрира в райони, които е известно, че страдат от нанесени щети. Оставете уловките през цялата нощ и ги прегледайте рано на следващата сутрин.

Мерки за безопасна работа и съхранение

Работа с продукта: Не са необходими специални системи за контрол. Да се избягва ненужен контакт с продукта за растителна защита. Неправилната употреба може да бъде вредна.

Съхранение: Да се съхранява безопасно, в оригиналната опаковка, далече от храна и извън обсега на деца.

Първа помощ и медицински съвети

Обща информация: Да се премести пострадалия от зоната на работа. Да се остави на добре проветриво място и да се предпази от хипотермия. Да не се дава нищо през устата и никога да не се предизвиква повръщане, когато пострадалия е в състояние на сънливост, кома или конвулсии. Свържете се с центъра за контрол на отравянията или с лекар. Консултирайте се с лекар и му покажете опаковката или етикета.

При контакт с очите: Задръжте очите отворени и изплакнете бавно и внимателно с вода в продължение на 15-20 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива, след първите 5 минути, след това продължете изплакването на очите. Следете за симптоми, описани по-долу.

При вдишване: Сместа е под формата на неразпрашаващи се пелети. При нормални условия на употреба вдишването не е приложимо като начин на експозиция.

При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло. Изперете го преди повторна употреба. Незабавно измийте кожата с вода и сапун. Следете за симптоми, описани по-долу.

При поглъщане: Измийте устата с обилно количество вода. В случай на поглъщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже контейнера/етикета/информационния лист за безопасност.

Да не се предизвиква повръщане, освен ако това не е препоръчано от центъра за контрол на отравянията или от лекар. Да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание.

Симптоми: нервно и храносмилателно разстройство.

Лечение: Няма известен антидот, прилага се симптоматично лечение (изпразване на стомаха, прилагане на активен въглен и слабително).

При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", тел: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Мерки при възникване на пожар:

Средства за гасене на пожар: При борба с пожар, в който е включен този материал да се използва пяна, сух химикал, въглероден диоксид или воден спрей. С цел да се предотврати прекомерното оттичане на водата се предпочита да се използва пяна или сух химикал като пожарогасително средство.

Указания за безопасно унищожаване на остатъци от продукта и празните опаковки

Остатъци или отпадъци от ПРЗ: Необходимо е да се предприемат методи за обезвреждане, при които да не се експонират диви или домашни животни или домашни любимци на сместа. Да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се замърсяват канализацията или водни басейни. Да се предава

на лицензирана фирма за събиране на опасни отпадъци. Позовете се на местните наредби за отпадъците и околната среда.

Опаковки: Празният контейнер да не се използва за никаква друга цел и трябва да се изхвърли като се вземат предвид коментарите по-горе.

Срок на годност: 2 години

Дата на производство: виж опаковката

Партида №: виж опаковката

Съдържание нето: 20 кг

Притежател на разрешението/Производител:

DE SANGOSSE S.A.S

Bonnel – BP5 - 47480 PONT DU CASSE (France)

Тел.: +33 553 693630, Факс : +33 553 663065

Лице, което пуска на пазара:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. "Бигла" № 39, партер, офис 2

тел: 02/962 49 01, www.sab.bg