

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА  
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ГРУПА 4А ИНСЕКТИЦИД

## МОСПИЛАН 20 СГ

ВНИМАНИЕ

UFI: 5HNP-DXYU-UJ6J-62KH



**Предупреждения за опасност:**

H302 Вреден при поглъщане

H361d Предполага се, че уврежда плода.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

**Препоръки за безопасност:**

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет / помощ.

P330 Изплакнете устата.

P391 Съберете разлятото

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / националните / международните разпоредби.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

**ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:** системен инсектицид

**АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:** 200 г/кг ацетамиприд

**ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА:** СГ – гранули, разтворими във вода

**КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:** втора професионална - продукт, който може да се прилага от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

**РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА** в Р. България със Заповеди № РД11-1250/13.10.2011 г., № РД11-409/16.03.2016 г., № РД11-787/26.03.2020 г., № РД11-177/21.01.2025 г. и № РД11-749/26.03.2026 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и **Разрешение № 01143-ПРЗ-2 / 25.03.2016 г.** за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

**НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:** Моспилан 20 СГ е инсектицид от групата на неоникотиноидите. Той е системен инсектицид с контактно и стомашно действие върху смучещи и гризеци насекоми.

Моспилан 20 СГ действа върху предаването на нервния импулс в нервната система на насекомите. Активното вещество се свързва със специфични рецепторни протеини на постсинаптичната мембрана. Това води до свръхвъзбуда на нервната система последвана от парализа и смърт на насекомото.

## РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

| Култура                                                                                   | Неприятел                                                                                                                                                                    | Момент на приложение                                                                                              | Доза<br>г/дка | Макс. брой<br>приложения<br>/интервал | Раб. р-р<br>л/дка | Каранти-<br>нен<br>срок |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| картофи                                                                                   | Колорадски бръмбар                                                                                                                                                           | ВВСН 40-89                                                                                                        | 12,5          | 2 през 14-21<br>дни                   | 15-100            | 7 дни                   |
|                                                                                           | Прасковена листна въшка                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | 20            |                                       |                   |                         |
| памук                                                                                     | Памукова листна въшка                                                                                                                                                        | ВВСН 15-84                                                                                                        | 20-25         | 2 през 14-21<br>дни                   | 15-100            | 14 дни                  |
|                                                                                           | Тютюнева белокрылка                                                                                                                                                          | Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69)                                                     | 25-30         |                                       |                   |                         |
| тютюн                                                                                     | Прасковена листна въшка,<br>Тютюнева листна въшка,<br>Тютюнева белокрылка                                                                                                    | ВВСН 31-65                                                                                                        | 25-30         | 2 през 14-21<br>дни                   | 50-100            | 14 дни                  |
| череша                                                                                    | Прасковена листна въшка,<br>Зелена ябълкова листна въшка,<br>Зелена цитрусова листна въшка,<br>Черна черешова листна въшка ,<br>Кръгломиниращ молец, Пъстър<br>миниращ молец | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) | 25            | 1                                     | 100-150           | 14 дни                  |
| люцерна                                                                                   | Въшки (Aphis craccivora, Aphis<br>sp., Myzus sp.)                                                                                                                            | ВВСН 33-81<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69)                                       | 7,5-10        | 2 през 14-21<br>дни                   | 50                | 14 дни                  |
| сливи                                                                                     | Прасковена листна въшка,<br>Зелена ябълкова листна въшка,<br>Кръгломиниращ молец, Пъстър<br>миниращ молец                                                                    | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) | 25            | 1                                     | 100               | 14 дни                  |
| домати,<br>пипер,<br>патладжан<br>(на полето)                                             | Прасковена листна въшка,<br>Памукова листна въшка                                                                                                                            | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) | 25            | 2 през 14-21<br>дни                   | 50-100            | 7 дни                   |
|                                                                                           | Тютюнева белокрылка,<br>Оранжев листна белокрылка                                                                                                                            |                                                                                                                   | 35-40         |                                       |                   |                         |
| патладжан (в<br>оранжерии)                                                                | Прасковена листна въшка,<br>Памукова листна въшка,<br>Тютюнева белокрылка,<br>Оранжев листна белокрылка                                                                      | ВВСН 75-89                                                                                                        | 25            | 2 през 14-21<br>дни                   | 100-170           | 14 дни                  |
| декоративни<br>култури:<br>роза, гербер,<br>хризантема,<br>бровалия,<br>коледна<br>звезда | Прасковена листна въшка,<br>Зелена розена листна въшка                                                                                                                       | Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69)                                                     | 25            | 2 през 14-21<br>дни                   | 100               | -                       |
|                                                                                           | Тютюнева белокрылка,<br>Оранжев листна белокрылка,<br>Калифорнийски трипс                                                                                                    |                                                                                                                   | 35-40         |                                       |                   |                         |
| Разрешени минимални употреби:                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |               |                                       |                   |                         |
| череша                                                                                    | Петнистокрила дрозифила<br>(Drosophila suzukii)                                                                                                                              | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) | 25            | 1                                     | 100 -<br>150      | 14 дни                  |
| сливи                                                                                     | Петнистокрила дрозифила<br>(Drosophila suzukii)                                                                                                                              | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) | 25            | 1                                     | 100               | 14 дни                  |
| домати (на<br>полето)                                                                     | Петнистокрила дрозифила<br>(Drosophila suzukii)                                                                                                                              | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)                                                                  | 25            | 1                                     | 50 - 100          | 7 дни                   |
| Череша,<br>сливи                                                                          | Черна златка (Capnodis<br>tenebrionis)                                                                                                                                       | Не по късно от ВВСН 81<br>(начало на оцветяване)<br>Да не се третира по време на<br>фазата на цъфтеж (ВВСН 60-69) | 25            | 1                                     | 100-150           | 14 дни                  |

**Забележки:** БАБХ не носи отговорност за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби на продукта. Отговорността за липса на ефикасност или проявена фитотоксичност при разрешените минимални употреби е на лицето, прилагащо продукта.

Количеството работен разтвор зависи от културата и от фазата и на развитие.

Дозите на приложение са в зависимост от популацията на неприятелите.

**ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:** Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода. Прибавете необходимото количество от продукта и долейте останалата вода при непрекъснато разбъркване. Приготвеният разтвор, трябва да се използва веднага и да не се оставя за ползване през следващите дни.

**СМЕСИМОСТ:** По препоръка на фирмата Моспилан 20 СГ може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти на пазара е препоръчително да се направи предварителен тест за съвместимост.

**УКАЗАНИЯ, ОТНОСНО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СЛЕДВАЩИТЕ КУЛТУРИ:** Моспилан 20 СГ не е фитотоксичен за културите, при които се прилага и не оказва влияние на следващите в сеитбообръщението култури.

**МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:** Токсичен за копринена буба. Силно токсичен за водните организми. При приложение на продукта, да не се замърсяват открити водни басейни и водоизточници.

#### **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:**

Да се пази от достъп на деца. Да се избягва контакт с очите, кожата и дрехите. Да не се вдишва прах. Ръцете и лицето да се измият старателно след работа с продукта. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Да се носят подходящи защитни дрехи, предпазни очила, ръкавици и ботуши. Да се избягва вдишването на прах. Да се носи противопрахова маска. След приключване на работа, старателно да се измият ръцете и всички изложени на контакт с продукта части на тялото. Работното облекло и предпазната екипировка да се почистят преди повторна употреба.

#### **ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:**

**При вдишване:** Незабавно преместете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой и в позиция незатруняваща дишането. Обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

**При контакт с кожата:** Свалете замърсените дрехи и обувки и измийте със сапун и обилно количество вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. Свалете замърсените дрехи и ги изперете преди повторна употреба.

**При контакт с очите:** Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

**При поглъщане:** Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар при неразположение.

**СЪВЕТИ КЪМ ЛЕКАРЯ:** Няма специфичен антидот. Поддържащо лечение. Терапия базирана на преценката на лекаря и в зависимост от симптомите на пациента.

**При необходимост се свържете с** Център за първа помощ в България: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов":  
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

**МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗПУСКАНЕ:** Съберете разсипания продукт и го поставете в затворен контейнер за по-късно унищожаване.

Проветрете помещението и измийте замърсеното място с детергент и обилно количество вода, след като продукта е бил събран.

Пазете от източници на запалване. Да се избягва контакт с кожата, очите и дрехите. Да не се вдишва прах. Водата от почистването да не се изхвърля в канализацията или водни басейни, тъй като продуктът е силно токсичен за водните организми.

**МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:** Пожарникарите да носят пълна предпазна екипировка и автономен дихателен апарат.

Подходящи средства за гасене на пожар: сух химикал, въглероден диоксид, пена или пръскане с вода.  
**УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ:** Да се изгарят в специални пещи за унищожаване на химически отпадъци. Унищожаването на отпадъците да става в съответствие с местните разпоредби за опазване здравето на хората и околната среда.

**СЪХРАНЕНИЕ:** Да се съхранява в плътно затворени опаковки, в сухи и хладни помещения. Опаковките да се пазят от директен контакт с вода или прекалена влага. Да се съхранява отделно от храни, напитки и фуражи, в заключени помещения, далеч от достъп на деца, животни и странични лица.

**ТРАНСПОРТ:** В съответствие с международните правила за транспортиране. Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** 2 години

**ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО:** (виж опаковката)

**ПАРТИДА №** (виж опаковката)

**ТЕГЛО НЕТО:** 0.5 кг e

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО/  
ПРОИЗВОДИТЕЛ:**

Nisso Chemical Europe GmbH  
Berliner Allee 42  
40212 Düsseldorf , Germany  
Phone +49-211-1306686-0  
Fax + 49 211 328231

**ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:**

Суммит Агро Румъния СРЛ – Клон България КЧТ  
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2  
тел: 02 / 962 49 01 факс: 02 / 962 48 76