

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ПАТЕЛ 300 ЕК



Опасно

Предупреждения за опасност:

H302 - Вреден при поглъщане.

H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P261 - Избягвайте вдишване на изпарения, аерозоли.

P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.

P301+P312 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

P305+P351+P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.

P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P405 - Да се съхранява под ключ.

P501 - Съдържанието и съдът да се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

Допълнително етикетиране:

SP 1 - Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

SPe3- Да се осигури нетретирана буферна зона с включена растителнозащитна ивица от 20 метра, при употреба на продукта при зимни зърнено-житни култури, нетретирана буферна зона с включена растителнозащитна ивица от 5 метра при пролетни зърнено-житни култури и зимна и пролетна маслодайна рапица, до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици и защитни очила/маска по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

Функция на продукта: Фунгицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: Протиоконазол- 300 г/л (28.04 % т./т.)

UFI : W660-K07P-Y00A-F4SQ

Вид на формулацията: Емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: Втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с **Разрешение №: 02011-ПРЗ-** Издание: 3/03.04.2023 г.

ПРЗ Пател 300 ЕК е идентичен на ПРЗ Протендо 300 ЕК.

Механизъм на действие:

Протиоконазол е абсорбиращо се активно вещество, инхибитор на биосинтеза на стерола (FRAC код: 3).

Разрешени употреби:

При пшеница (зимна и пролетна) за контрол на **кафява ръжда** (*Puccinia triticina*), **жълта ръжда** (*Puccinia striiformis*), **ранен листен пригор** (*Septoria tritici*), **жълто-кафяви петна** (*Pyrenophora tritici-repentis*), **фузариози** (*Fusarium spp.*) в доза 33- 65 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: от забележими 5 братя до край на цъфтежа (BVCH 25-69)

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника.

При ечемик (зимен и пролетен) за контрол на **листна ръжда** (*Puccinia hordei*), **мрежести петна** (*Pyrenophora teres*), **листен пригор** (*Rhynchosporium secalis*) в доза 33- 65 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: от забележими 5 братя до начало на цъфтеж: видими първи прашници (BVCH 25-61).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника.

При тритикале за контрол на **ранен листен пригор** (*Septoria tritici*), **листен пригор** (*Rhynchosporium secalis*) в доза 33- 65 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: от забележими 5 братя до начало на цъфтеж: видими първи прашници (BVCH 25-61).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника.

При ръж за контрол на **кафява ръжда** (*Puccinia triticina*), **листен пригор** (*Rhynchosporium secalis*) в доза 33- 65 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: от забележими 5 братя до начало на цъфтеж: видими първи прашници (ВВСН 25-61).

Максимален брой приложения на година: 2

Минимален интервал между приложенията: 14 дни

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника.

При маслодайна рапица (зимна и пролетна) за контрол на:

Сухо стъблено гниене (*Phoma lingam*) в доза 30-60 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л количество вода/дка.

Момент за приложение: През есента от разтворен шести лист до 9 или повече листа оформени (ВВСН 16-19) и през пролетта от фаза няма странични разклонения до фаза „жълт бутон“ (ВВСН 20- 59). Едно есенно и едно пролетно приложение.

Минимален интервал между приложенията: 86 дни

Сухо стъблено гниене (*Phoma lingam*), склеротиния (*Sclerotinia sclerotiorum*), в доза 30-60 мл продукт/дка, приложено с 20-40 л/дка количество вода.

Момент за приложение: през пролетта от фаза няма странични разклонения до край на цъфтежа (ВВСН 20- 69). Две пролетни приложения при спазване на Закона за пчеларството.

Минимален интервал между приложенията: 21 дни

Максимален брой приложения на година при рапица- 2.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 56 дни

Техника на приложение: Механизирана наземна техника.

Период на изчакване за повторно навлизане в третираните площи: до пълно изсъхване на третираната растителна повърхност.

Указания за технологията на растителна защита:

При зърнено- житни култури (зимна и пролетна пшеница, зимен и пролетен ечемик, ръж, тритикале), се препоръчва започване на превантивно пръскане срещу листни петна и ръжда, като се следи агрометеорологичната прогноза, но най-късно при първите прояви на заболяването, обикновено в началото на растеж на стъблото, и в зависимост от степента на опасност от зараза, следва да се повтори след 2-3 седмици. Третирането с продукта срещу фузариоза по класовете, е препоръчително да се извърши в началото на цъфтежа, като се стремим да постигнем равномерно покритие на класовете с работния разтвор за пръскане. При обстоятелства, предразполагащи към заразяване, както и срещу пиренофора (*Pyrenophora*), по листата и фузариоза по класовете, е оправдано прилагането на разрешената по-висока доза (65 мл/дка).

При пролетната и зимна рапица, се препоръчва започване на превантивно прилагане на продукта срещу гъбични заболявания, но най-късно при първите прояви на заболяването. При обстоятелства, предразполагащи към заразяване и срещу сухо стъблено гниене, се препоръчва едно третиране през есента (при зимна рапица) във фаза „жълт бутон“. Пролетното третиране е целесъобразно да се предприеме в периода на формиране на страничните разклонения. Пръскането срещу склеротиния е необходимо да се извършва в първата половина на цъфтежа.

С цел избягване формирането на резистентност, се препоръчва редуване на продукта с други, съдържащи активни вещества с различен механизъм на действие.

Първа помощ и медицински съвети

При вдишване: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

При контакт с кожата: Измийте кожата с много вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно да се извика лекар.

При поглъщане: Изплакнете устата. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Притежател на разрешението:

Globachem N.V.,

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019,

3800 Sint-Truiden,

Belgium

Дистрибутор:

Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ,

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2,

тел: 02 / 962 49 01; факс: 02 / 962 48 76.

Срок на годност: 3 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство: Вижте опаковката

Партида №: Вижте опаковката

Нето количество:.... L

