

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ПЕНДИНОВА

ГРУПА 3 ХЕРБИЦИД

ОПАСНО



Предупреждения за опасност

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Препоръки за безопасност

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/ на лекар.

P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода и сапун.

P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

P391 Съберете разлятото

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетиране:

SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се избягва замърсяването чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe3 С цел опазване на водните организми да се осигури:

- 5 м буферна зона и 5 м растителна ивица и дюзи намаляващи отвяването на струята 75% при пролетна и зимна маслодайна рапица, картофи, тютюн, тревен чим (тревни площи/люцерна), овощни култури, цитруси и памук.

- 10 м буферна зона и 10 м растителна ивица и дюзи намаляващи отвяването с 50% при зимни зърнено-житни култури.

- 20 м буферна зона при царевица и полски фасул.

- 20 м буферна зона + 20 м растителна ивица при пролетни зърнено-житни култури, коренови и стъблени зеленчуци, луковични и листни зелчуци, зеленчуци формиращи плодове, бобови култури, слънчоглед, соя и лози.

EUN208 Съдържа пендиметалин (CAS 40487-42-1). Може да предизвика алергична реакция

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Рискът за оператора е приемлив с използване на лични предпазни средства (ръкавици) по време на смесване и зареждане на продукта.

Съдържание на активното вещество: пендиметалин 330 г/л

Функция на продукта: хербицид

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Разрешен за употреба в Р. България със Заповеди № РД 11-2130/19.10.2017г. и № РД 11-228/17.02.2022г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и **Разрешение № 01510-ПРЗ-2/11.03.2022 г.**

ПРЗ Пендинова притежава допълнително търговско наименование Адмето.

Категория на употреба: втора професионална

Разрешени употреби

Хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели:

Култура	Доза мл/дка	Момент на приложение
Слънчоглед, Соя, Фъстъци	400-600	преди поникване на културата
Царевица	400-600	преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-12)
Картофи, Моркови, Грах, Фасул, Бакла, Нахут	400-600	преди поникване на културата
Пшеница, Ечемик, Ръж	400-600	преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13)
Ориз (суха сеитба)	400-510	
Тютюн	400-600	преди или след разсаждане на култура, между редовете с насочено пръскане
Памук	400-600	преди поникване на културата
Пипер, Домати, Патладжан	300-600	преди поникване или преди разсаждане на културата
Зеле, Карфиол, Броколи	300-600	преди разсаждане на културата
Лук	300-500	преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13)
Чесън	400-600	преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13)
Марули, Цикория, Ендивия	300-500	преди разсаждане на културата
Аспержи	300-500	преди прорастване на културата, по време на покой
Артишок	300-500	преди засаждане/разсаждане
Лозя, Ябълки, Круши, Праскови, Нектарини, Кайсии	400-600	в периода на покой (преди поникване на плевелите)
Цитруси: Портокал, Лимон, Лайм, Грейпфрут и всички техни хибриди	400-600	През пролетта/есента (преди поникване на плевелите)
Декоративни култури, разсадници и дървесни видове	300-400	Преди разсаждане - третиране цялата площ, след разсаждане – насочено пръскане
Житни треви за семена	300	след поникване само при създаване на пасище, при 6 братя/растение

Количество работен разтвор на дка: 20 – 60 л вода/дка

Максимален брой приложения: 1

Техника на приложение за всички употреби: конвенционална наземна техника

Карантинен срок: аспержи - 28 дни; марули, цикория, ендивия -75 дни; зеле, карфиол, броколи - 90 дни; моркови - 140 дни; при всички останали култури – не се изисква

Изисква се интервал преди засаждане на последващи култури от минимум 180 дни с изключение на: коренови и грудкови култури – 190 дни, цвекло – 300 дни, луковични зеленчуци – 200 дни, листни зеленчуци – 200 дни, зърнено-житни култури – 200 дни

Контролирани плевели:

Едногодишни житни плевели: Лисича опашка полска (*Alopecurus myosuroides*), Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), Кокошо просо (*Echinochloa crus-galli*), Кошрява зелена (*Setaria viridis*), Балур (*Sorghum halepense*) (от семена), Диво просо (*Panicum dichotomiflorum*).

Едногодишни широколистни плевели: видове щир (*Amaranthus spp.*), Овчарска торбичка обикновена (*Capsella bursa pastoris*), Бяла лобода (*Chenopodium album*), Мак див (*Papaver rhoeas*), Тученица обикновена (*Portulaca oleracea*), видове фасулче (*Polygonum spp.*), видове звезда (*Stellaria spp.*), Попова лъжичка (*Thlaspi arvense*).

Фитотоксичност: консултирайте се с местният дистрибутор на продукта, относно чувствителността на културите и култури за засяване след пропадане на културата третирана с този продукт.

Устойчивост: за да се предотврати или забави появата на устойчиви видове плевели, редувайте прилагането на този хербицид с хербициди с различен механизъм на действие и прилагайте подходящи агрономически практики за борба с плевелите – ротация на културите, лъжлива сеитба, контрол с механични средства и др.

Обследвайте регулярно посевите/насажденията за евентуалната поява на слаб контрол на плевелите от продукта.

Смесване, приложение и почистване на оборудването

Рискът за оператора е приемлив с използване на лични предпазни средства (ръкавици) по време на смесване и зареждане на продукта.

Не приготвяйте повече работен разтвор от необходимото.

Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнена с половината от необходимият обем чиста вода. Включете разбъркването. Добавете продукта в резервоара при непрекъснато разбъркване и допълнете резервоара до необходимият обем. До приключване на пръскането да не се изключва бъркалката.

Прилагайте продукта с фина или средна капка, за да се осигури по-добро покритие.

Избягвайте разливане. В случай на разлив, отстранете замърсените дрехи и измийте кожата незабавно.

Изпразнете опаковката и я изплакнете с устройство с вода под налягане или трикратно ръчно.

Измийте оборудването незабавно след употреба с препарат за почистване на резервоари.

Почистете оборудването изцяло. Да се избегне замърсяване по време на работа, приложение и изхвърляне на отпадъците, за да се избегне непреднамерено увреждане на растителността и на околната среда.

Мерки за първа помощ:

При неразположение незабавно потърсете медицинска помощ (покажете етикета когато е възможно).

Вдишване: преместете незабавно експонираното лице от района на чист въздух. При затруднено дишане да се приложи изкуствено такова. Незабавно се консултирайте с лекар.

Контакт с кожата: незабавно измийте с голямо количество вода и сапун.

Контакт с очите: незабавно измийте с голямо количество вода. Ако дразненето продължава се консултирайте с лекар.

Поглъщане: устата да се изплакне незабавно. Да не се предизвиква повръщане поради риск от аспирация.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен)
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

Съхранение: Дръжте контейнерите плътно затворени в сухо, хладно и проветриво място, отделно от храна, включително храна за животни. Съхранявайте далеч от източници на топлина. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Срок на годност: 2 години

Дата на производство: виж опаковката

Партиден №: виж опаковката

Нетно съдържание: 5 – 10 - 20 л

Притежател на разрешението:

Финчимика С.п.А., Италия

Производител:

Ширм ГмбХ, Германия

Лице, което пуска продукта на пазара:

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

Тел: 02 / 962 4901; Факс: 02 / 962 4876