

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ТИДЕКС

Селективен системен хербицид за контрол на широколистни плевели при зърнено-житни култури, царевица, семкови овощни видове и тревни площи

ГРУПА 4 ХЕРБИЦИД



Предупреждения за опасност:

H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетиране:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища);

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра при семкови овощни култури до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: флуроксипир 200 г/л

Вид на формулацията: емулсия, масло във вода (ЕВ)

Категория на употреба: непрофесионална.

Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение №: 01880-ПРЗ/ 04.09.2020г.

Притежател на разрешението

Exclusivas Sarabia S.A.

Camí de l'Albí – Ptda. Rec Nou s/n

25110 Alpicat (Lleida), SPAIN

Дистрибутор:

Суммит Агро Румъния СРЛ - клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел: 02 9624901; факс: 02 9624876

Срок на годност: 2 години след датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Дата на производство:

Партида №:

Нето количество:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Носете защитни ръкавици по време на третиранията на ръка.

Да не се навлиза в третираниите площи, преди третиранията повърхност на листата да е напълно суха. Не замърсявайте водата с продукта или неговата опаковка. Не почиствайте съоръженията за третиране близо до повърхностните води. Избягвайте замърсяването чрез системите за отвеждане на водата от ферми и пътища.

ВАЖНО: Тази информация е одобрена като част от етикета на продукта. Всички инструкции в тази секция трябва да се прочетат внимателно за безопасна и ефикасна употреба на продукта.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА

Флуроксипирът е селективен хербицид, синтетичен ауксин, който навлиза предимно през листата и бързо се пренася в останалите части на растението. Симптомите включват характерни за ауксина реакции, като завиване на листа.

Флуроксипирът принадлежи към химическата група на пиридинкарбоксилните киселини. Начинът на действие на флуроксипир се класифицира според HRAC (Комитет за действие срещу резистентността към хербицидите) в група О (синтетични ауксини, които действат като индолилоцетна киселина (IAA)).

Понастоящем няма резистентност или кръстосана резистентност към флуроксипир при някои от тестваните биотипове плевелни видове (лепка, врабови чревца, петниста бударица, полска поветица).

Рискът от развитие на резистентност на широколистните плевели към флуроксипир е малко вероятен и ТИДЕКС може да бъде използван за контролиране на всички биотипове - включително и тези, които са устойчиви на друг механизъм на действие (например врабови чревца, лапад, лепка).

За да се ограничи рискът от резистентност, препоръките на този етикет трябва внимателно да се следват. Да се прилагат алтернативни методи за контрол на плевелите (механичен, културален и др.) и когато е възможно да се използват продукти с различни механизъм на действие, за да се избегне появата на устойчивост.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

При зърнено – житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, тритикале, ръж, овес) за контрол на широколистни плевели (след поникване) в доза 100 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка.

Момент за приложение: BBCH 12-39 (2 листа разтворени – фаза на флаговия лист: флаговият лист е напълно разтворен лигулата е едва видима).

Максимален брой приложения на година: 1

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: не се изисква.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

При **царевица** за контрол на широколистни плевели (след поникване) в доза 100 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка.

Момент за приложение: BBCH 12-16 (разтваряне на втори лист – растежа продължава до разтваряне на шести лист).

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: не се изисква.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

При **семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули)** за контрол на **широколистни плевели** (след поникване) в доза 150 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка.

Момент за приложение: пролет – есен.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: 15 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника. Насочено приложение без пръскане на листа, стъбла, издънки на дръвчета. Приложението е разрешено след третата година от засаждането или по-късно.

При **тревни площи** за контрол на **широколистни плевели** (след поникване) в доза 100 мл продукт/дка, приложена с 20-40 л вода/дка.

Момент за приложение: ВВСН 20-26.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - минимален интервал преди прибиране на реколтата: не се изисква.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Кореноплодни и грудкови зеленчуци да не се отглеждат като ротационни култури след употреба на флуороксипир за период от 10 месеца.

При пропадане на културата подходящи за отглеждане последващи култури са зърнени култури, маслодайна рапица и царевица.

Няма ограничения при културите които ще се засеят/засадят 5 седмици след приложението на ТИДЕКС.

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ:

ТИДЕКС контролира чувствителните широколистни плевели, които вече са поникнали. Ефикасността не се влияе от вида на почвата, но се влияе от вида плевели, от етапа на развитие (младите плевели са по-чувствителни) и от метеорологичните условия. Ефикасността е оптимизирана при добри условия на отглеждане. Ефикасността може да се намали при ниски температури (по-ниски от 10 °C) или при сухи условия.

ПРЕПОРЪКИ:

При семковите овощни видове използвайте ТИДЕКС вътре в реда (прилагайте максимум на 1/3 от повърхността на насаждението).

Използвайте ТИДЕКС с количество вода 20-40 л/дка. Най-малкото количество вода трябва да се използва само при много отворени култури и при малко плевели. При по-късни приложения, когато културата се е развила, обемът на пръскането трябва да се увеличи до 40 л/дка.

Прилагайте върху активно растящи плевели (в начална фаза на развитие на плевелите).

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ:

Не прилагайте продукта при ветровито време, за да се предотврати отнасянето му върху съседни култури и водоеми.

СМЕСВАНЕ:

Преди употреба се уверете, че всички съоръжения за третиране са чисти. Напълнете резервоара до половината с чиста вода, започнете да разбърквате и добавете необходимото количество ТИДЕКС. Допълнете резервоара с необходимото количество вода, като бъркате непрекъснато. Продължете да разбърквате до пълното изразходване на работната смес.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ТИДЕКС трябва да се прилага с оборудване, което позволява добро покритие на плевелите. Пръскането да се извършва с налягане от 2-3 бара. Избягвайте отнасяне на разтвора, особено към чувствителни култури.

Не оставяйте сместа в резервоара дълго време.

СЪВМЕСТИМОСТ:

Смесването с други продукти трябва да се извършва само в съответствие с препоръките за употреба, разрешени в техните етикети.

Всички смеси трябва да се извършват съгласно приложимото национално законодателство.

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР:

След всяко третиране с ТИДЕКС, изплакнете оборудването старателно като премахнете всички видими следи от продукта от вътрешната страна на резервоара. Напълнете резервоара с чиста вода до 10% от обема му, промийте цялата инсталация и след това източете резервоара напълно. Напълнете резервоара до $\frac{1}{4}$ от обема му и я оставете да циркулира в инсталацията. Източете водата и повторете процедурата на изплакване два пъти.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте в оригиналната опаковка, плътно затворена, на безопасно място.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ:

Общи мерки за първа помощ: Потърсете лекар или токсикологичен център. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако почувствате неразположение, потърсете медицинска помощ (ако е възможно, покажете етикета).

Вдишване: При симптоми: отидете на открито място и проветрете място на експозиция. Осигурете чист въздух. Оставете пострадалия да почива. Обадете се в токсикологичен център или на лекар, ако имате съмнения или ако симптомите продължават.

Контакт с кожата: При симптоми: незабавно изплакнете мястото обилно с вода. Отстранете замърсеното облекло и измийте всички изложени части с неутрален сапун и вода, последвани от изплакване с топла вода. Обадете се в токсикологичен център или на лекар, ако имате съмнения или ако симптомите продължават.

Контакт с очите: Внимателно изплакнете с вода за няколко минути и при необходимост се консултирайте с лекар. Премахнете контактните лещи, ако има такива и ако е лесно да се направи. Продължете да изплакнете. При съмнение или ако симптомите продължават, обадете се в токсикологичен център или на лекар.

Поглъщане: Изплакнете устата с вода, не предизвиквайте повръщане. Потърсете спешно медицинска помощ. Обадете се в токсикологичен център или на лекар, ако чувствате неразположение.

При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - тел. +359 2 9154 233 (денонощен)

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се

предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Важно: Всички материали, които предоставяме, са с високо качество и се считат за подходящи за целта, за която са изрично предвидени, но тъй като не можем да повлияем или контролираме тяхното смесване и употреба, всички условия и гаранции, правни или не, към качеството или адекватността на нашите материали са изключени и не поемаме отговорност за никакви повреди или наранявания в резултат на тяхното съхранение, обработка, приложение или употреба.

ВНИМАНИЕ: да се използва изключително за употребите и условията, включени в този етикет. Лицето което използва продукта, носи отговорност за щети, причинени от злоупотреба с продукта. Спазването на цялата информация, предоставена в този етикет, е от съществено значение, за да се гарантира ефективността на приложението и да се избегне увреждане на растения, хора и животни. Не прилагайте с въздухоплавателни средства. За да избегнете рисковете за човека и околната среда, следвайте инструкциите. Работете с продукта при отсъствие на вятър. Да не се продава в насипно състояние.