

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**

**РИМ 25 ВГ™**

Хербицид за употреба при царевица, картофи и домати за контрол на широколистни и житни плевели

**ГРУПА 2 ХЕРБИЦИД**

**Внимание**

**UFI: 1SSD-XWHN-W602-JQP7**



**Съдържа:** Кизелгур

**Предупреждения за опасност:**

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

**Препоръки за безопасност:**

P261 Избягвайте вдишване на прах, дим.

P280 Използвайте предпазни очила, предпазно облекло, предпазни ръкавици.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с националните разпоредби.

**Допълнително етикетирание:**

SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

SPe2 Да не се прилага при дренирани почви с рН по - голямо от 7,5 и наклон по - малък от 0,5 % с цел опазване на водните организми при ранни картофи.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при царевица и домати.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра с включена в нея растителнозащитна ивица от 15 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми при картофи.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 15 метра или 10 метра с включени дюзи, намаляващи отвяването с 50% или 5 метра с включени дюзи, намаляващи отвяването със 75% до неземеделски земи с цел опазване на растенията, които не са обект на третиране.

**Особени изисквания:** Да се използват защитни очила/ маска при работа с продукта.  
**Период на изчакване преди повторно влизане в третираната площ:** Да не се влиза повторно в третираните култури преди пълното изсъхване на разтвора върху листната повърхност.

**Функция на продукта:** Хербицид със системно действие

**Съдържание на активно вещество:** Римсулфурон-250 г/кг (25 % т./т.)

**Вид на формулацията:** Вододиспергируеми гранули (ВГ)

**Категория на употреба:** Втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с

**Разрешение №: 02026-ПРЗ-1/19.05.2022 г.**

**Описание на продукта:**

РИМ 25 ВГ е хербицид за листно приложение при царевица, домати и картофи за контрол на едногодишни и многогодишни широколистни плевели и житни плевели. Съдържа активно вещество римсулфурон. Римсулфурон принадлежи към сулфониурейната група. Приложен след поникването е ефективен при широк спектър от плевели. Това вещество обикновено засяга чувствителни плевели в ранните етапи на развитие.

**Разрешени употреби:**

| Култура            | Плевели                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Момент на приложение                                                                                                               | Доза на приложение (г продукт / дка) | Максимален брой приложения на година | Количество вода (л/дка) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Царевица           | дараджан ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ), обикновен щир ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ), пълзящ пирей ( <i>Elymus repens</i> ), овчарска торбичка ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ), немиризлива лайка ( <i>Matricaria inodora</i> ), полска попова лъжичка ( <i>Thlaspi arvense</i> ) | ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист), след поникване на плевелите                                        | 6 г /дка                             | 1                                    | 10-50                   |
| Картофи            | полска повитица ( <i>Convolvulus arvensis</i> ), овчарска торбичка ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ), полски синап ( <i>Sinapis arvensis</i> )                                                                                                                                             | ВВСН 12-18 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло- разтваряне на 8 листа на главното стъбло), след поникване на плевелите | 6 г /дка                             | 1                                    | 20-60                   |
| Домати (на полето) | щир ( <i>Amaranthus sp.</i> ), полски синап ( <i>Sinapis arvensis</i> )                                                                                                                                                                                                                     | ВВСН 12-18 (втори същински лист-осми същински лист), след поникване на плевелите                                                   | 6 г /дка                             | 1                                    | 10-40                   |

**Да не се прилага при сладка царевица.**

**Карантинен срок** - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: Не се изисква - покрива се от периода на развитие на културите.

**Техника на приложение:** Механизирана наземна техника

#### **Култури в сеитбооборота:**

Няма риск за следващи култури, засети през есента след прибиране на царевица, третирана с РИМ 25 ВГ. Препоръчва се обработка на почвата преди сеитба.

#### **Подмяна след пропадане на културата:**

Необходим е период от 120 дни преди сеитбата на грах. Необходим е период от 60 дни преди сеитбата на пролетен ечемик, захарно цвекло и слънчоглед. Винаги се изисква оран преди сеитба.

#### **Управление на резистентността**

Броят на приложенията в царевицата трябва да бъде ограничен до 1 приложение на цикъл на култура.

#### **Приготвяне на работния разтвор**

Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с вода, добавете необходимото количество РИМ 25 ВГ и разбъркайте добре. Напълнете напълно резервоара с вода. Сместа за пръскане трябва да се разбърква непрекъснато, докато пръскането приключи. Нанесете чрез пръскане.

#### **Почистване на оборудването**

Цялото оборудване за приложение и замърсеното защитно облекло трябва да се измият / почистят с вода или разреден разтвор на детергент и да се изплакнат добре. Трябва да се внимава да не се замърсят водни обекти със замърсените промивни води. Замърсените течности от почистването трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с местните разпоредби.

Избягвайте разливи. В случай на разлив, отстранете замърсените дрехи и измийте кожата незабавно.

Веднага след пръскане, източете напълно резервоара. Всяко замърсяване от външната страна на оборудването за пръскане трябва да се отстрани чрез измиване с чиста вода. Изплакнете вътрешността на резервоара с чиста вода и изплакнете през стрелите и маркучите, като използвате поне една трета от обема на резервоара за пръскане. Напълнете наполовина резервоара с вода, разбъркайте и източете напълно резервоара. Повторете тази стъпка отново.

#### **Първа помощ и медицински съвети**

**Първа помощ при вдишване:** Пострадалият да се изведе далече от замърсената зона и да се отведе на чист въздух. Ако пострадалият не диша, да се направи изкуствено дишане. Да се повика лекар.

**Първа помощ при контакт с кожата:** Да се свалят замърсените дрехи. След контакт с кожата веднага се измийте с обилно количество вода и сапун.

**Първа помощ при контакт с очите:** Да се измие обилно с вода (в продължение на минимум 20 минути), като държите очите широко отворени, след сваляне на меките контактни лещи, след това незабавно потърсете медицинска помощ.

**Първа помощ при поглъщане:** Изплакнете устата. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

**При необходимост се свържете с Център за първа помощ в Република България:**  
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов": тел. +359 2 9154 233 (денонощен)  
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

**Безопасно обезвреждане на остатъците от продукта:**

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

**Съхранение:**

Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се пази от пряка слънчева светлина. Температура на съхранение 0 – 30 °C.

**Срок на годност:** 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

**Дата на производство:** виж опаковката

**Партида №:** виж опаковката

**Притежател на разрешението:**

Sharda Cropchem Espana S.L.  
Edificio Atalayas business center,  
Carril Condomina 3, 12 floor,  
30006 Murcia, Spain

**Дистрибутор:**

Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ  
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2  
тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876; [www.sab.bg](http://www.sab.bg)

**Нето количество: 100 г е**