

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета.

ТРЕЗИН

Внимание



Предупреждения за опасност:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUN208 Съдържа 1,2-бензизотиазол -3 (2H) –он. Може да предизвика алергична реакция.
EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P103 Преди употреба прочетете етикета.
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетирание:

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита (ПРЗ) или с неговата опаковка.(Да не се почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe2 Да не се прилага при почви със съдържание на глина над 45%, с цел опазване на водните организми/подпочвените води.

SPe3 Да се осигури растителнозащитна ивица от 10 метра при зърнено-житни култури до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

При навлизане на работниците в третираните площи, те трябва да са облечени с риза с дълги ръкави, панталони, чорапи и обувки.

Работниците трябва да носят ръкавици по време на приготвянето на работния разтвор, прилагането на продукта и при контакт със замърсени повърхности.

Предотвратете влизането на работници и други лица в третираните площи до пълното им изсъхване.

След употреба на продукта, изперете защитното облекло, обръщайки особено внимание на вътрешната страна на ръкавиците.

Функция на продукта: фунгицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: 250 г/л азоксистробин

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: непрофесионална

Разрешен за употреба в Република България с Разрешение № 01849-ПРЗ-2/17.05.2023 г.
ПРЗ Трезин е идентичен на ПРЗ Трунфо.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

ТРЕЗИН е фунгицид съдържащ активното вещество азоксистробин, принадлежащо към семейството на стробилурините (метоксиакрилат), което инхибира митохондриалната респирация в комплекс III (цитохром bc1) и принадлежи към група QoI (Quinone Outside Inhibitors); група 3 на FRAC (Fungicide Resistance Action Committee). В растенията азоксистробинът се придвижва трансламинарно и със странична дифузия.

Ефикасността на продукта не се повлиява от валежи паднали 2 часа след прилагането. Повторете третирането отново, ако падне дъжд, преди работният разтвор върху третираните растения да е изсъхнал.

Продуктът има превантивно, лечебно и антиспорообразуващо действие, но по същество действа превантивно.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

- При **краставици, корнишони и тиквички (в оранжерии)** за контрол на **брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*)**, в доза **80 мл продукт/гка**, приложена с 50-100 л/гка количество вода.

Момент на приложение: ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло - пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта. Продуктът има 10 дни последствие. При спазване на закона за пчеларството.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - Времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 1 ден.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

- При **пъпешу, дини и тикви (в оранжерии)** за контрол на **брашнеста мана (*Sphaerotheca fuliginea*)**, в доза **80 мл продукт/гка**, приложена с 50-100 л/гка количество вода.

Момент на приложение: ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло - пълна зрялост), превантивно, при поява на първи симптоми до когато има условия за развитие на болестта. Продуктът има 10 дни последствие.

Максимален брой приложения на година: 3.

Минимален интервал между приложенията: 10 дни.

Карантинен срок - Времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

- При **домати (в оранжерии)** за контрол на **брашнеста мана (*Leveillula taurica*)**, в доза **100 мл продукт/гка**, приложена с 50-100 л/гка количество вода.

Момент на приложение: ВВСН 51-89 (поява на първи цвят на главното стъбло-пълна зрялост), превантивно - при поява на първи симптоми. Продуктът има от 10 до 12 дни последствие.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - Времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 3 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

- При **пшеница** за контрол на **брашнеста мана (*Erysiphe graminis*)**, **кафява ръжда (*Puccinia recondita*)**, **септориоза (*Septoria spp.*)**, в доза **100 мл продукт/гка**, приложена с 20-40 л/гка количество вода.

Момент на приложение: ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа), превантивно, при поява на първи симптоми.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

- При **ечемик** за контрол на **брашнеста мана (Erysiphe graminis)**, **кафява ръжда (Puccinia recondita)**, **хелминтоспориоза (Helminthosporium graminea)**, в доза **100 мл прогукм/gka**, приложена с 20-40 л/gka количество вода.

Момент на приложение: ВВСН 31-69 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене-край на цъфтежа), превантивно, при поява на първи симптоми.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 35 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

- При **ориз** за контрол на **пиракулариоза (Magnaporthe grisea)**, **хелминтоспориоза (Cochliobolus miyabeanus)**, в доза **100 мл прогукм/gka**, приложена с 20-40 л/gka количество вода.

Момент на приложение: ВВСН 43-87 (средна фаза на зреене: влагалището на флаговия лист е 5-10 см извън влагалището на предпоследния лист-восьчна зрелост (твърда консистенция), превантивно, при поява на първи симптоми.

Максимален брой приложения на година: 1.

Карантинен срок - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: 28 дни.

Техника на приложение: конвенционална наземна техника.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА:

За да предотвратите развитието на резистентност, максималният брой третирания с този продукт или който и да било друг от групата QoI, на година или сезон, за посочените болести е:

- 3 пъти за краставици, корнишони, тиквички, пъпеша, тикви и дини (оранжерия);

- 1 път за домати (оранжерия), пшеница, ечемик и ориз.

Алтернативно редувайте този продукт с фунгициди, с различен механизъм на действие.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:

Разклатете добре опаковката с продукта до хомогенност. Напълнете резервоара на пръскачката наполовина. В съд смесете нужното количество продукт, с малко количество вода и разбърквайте непрекъснато, докато се получи еднородна и хомогенна смес.

Изсипете тази смес в резервоара на пръскачката и долейте до необходимото количество вода. По време на смесване и пръскане, гръжте бъркалната вълночка. Избягвайте да оставяте разтвора без да е включена бъркалната вълночка.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Калибрирайте оборудването правилно спрямо обема на работния разтвор, изразходван на декар, според дебита на пръскачката (л/мин), скоростта и работната ширина (разстояние между гюзите) със специално внимание на еднородността при разпределението на разтвора. Количеството продукт и работен разтвор трябва да съответстват на площта на приложение, като се следват посочените дози.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:

Вдишване: Този продукт не съдържа вещества, класифицирани като опасни при вдишване. Въпреки това, в случай на симптоми на интоксикация преместете експонираното лице на чист въздух и му осигурете покой. Потърсете медицинска помощ, ако симптомите продължат.

Контакт с кожата: В случай на контакт с кожата се препоръчва да се измие кожата старателно с вода и неутрален сапун. В случай на промяна на кожата (парене, зачервяване, обриви, образуване на мехури) потърсете лекарски съвет и носете информационният лист за безопасност.

Контакт с очите: Изплакнете обилно с хладка вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако засегнатото лице използва контактни лещи, то те трябва да бъдат отстранени, освен ако не са залепнали за очите, тъй като това може да причини допълнителни щети. Във всички случаи, след почистване, е наложителна консултация с лекар, като носите информационният лист за безопасност.

Поглъщане/аспирация: В случай на приемане, незабавно потърсете медицинска помощ, като покажете информационният лист за безопасност за продукта.

В СЛУЧАЙ НА ИНТОКСИКАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (генонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРОДУКТА:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката.

Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

СЪХРАНЕНИЕ:

Съхранявайте в сухо помещение, далече от светлина. Да се съхранява далече от източници на топлина, радиация, статично електричество, храни, силни киселини и основи.

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение.

Нето количество: 5 L