

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

БРИКСТЪН

ГРУПА	1	ХЕРБИЦИД
-------	---	----------

Опасно



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ: Съдържа: въглеводороди C10 ароматни <1% нафтаген; клетодим; H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища; H317 Може да причини алергична кожна реакция; H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите; H336 Може да причини сънливост или световъртеж; H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект; EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба; EUN066 Повтарящата се експозиция може да причини изсушаване или напукване на кожата.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: P261 Избягвайте вдишването на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли; P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице; P301+P310+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане; P304+P340+P312 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар; P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода; P391 Съберете разлятото; P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен; P405 Да се съхранява под ключ; P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЕТИКЕТИРАНЕ: SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.); SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м до неземеделски земи с цел опазване на членестоногите, които не са обект на третиране; SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 м с включени дюзи намаляващи разпръскването с 50% до неземеделски земи с цел опазване на растенията.

Продуктът да се прилага на 2-3 м буферна зона при ниски култури и 5 м буферна зона при високи култури, с цел за предпазване на живущи и случайно намиращи се наблизо лица.

Да се използва работно облекло, покриващо ръце, тяло и крака, и лични предпазни средства - респираторна маска, защитни очила/маска за лицето, защитни ръкавици по време на смесване, зареждане и прилагане на продукта.

За употреба при моркови, декоративни растения, аспержи, кореноплодни и грудкови зеленчуци: използвайте продукта само в един вегетационен период.

За употреба при лозя, райска ябълка, ябълка, круша, мушмула, японска мушмула, дюля, кайсия, праскова, нектарина, слива и череша, цитруси (портокал, мандарина, грейпфрут, лимон, лайм), киви, леска, бадем, разсадници за овощни култури и лозя: третиране в редовете, максимум 30% от площта на насаждението.

Функция на продукта: хербицид със системно действие

Съдържание на активно вещество: клетодим (clethodim) - 180 г/л

Вид на формулацията: емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: втора професионална

Разрешен за пускане на пазара и употреба в Република България с **Разрешение №: 02178-ПРЗ** Издание 1/30.04.2025 г.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

БРИКСТЪН е системен хербицид за контрол след поникване на някои едногодишни и многогодишни житни плевели в широколистни култури, лозя, овощни и декоративни култури.

БРИКСТЪН се абсорбира през листата и се придвижва към корените и в надземните части на растението. При чувствителните плевели, около 10-20 дни след третирането, се наблюдават симптоми изразяващи се в спиране на растежа, пожълтяване на листата и накрая загиване.

БРИКСТЪН съдържа специфичен адювант от природен произход, който осигурява по-добро абсорбиране на БРИКСТЪН от плевелите, за да се подобри ефикасността на продукта.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ПЛЕВЕЛИ:

При полски култури (малодайна рапица, картофи, соя, захарно цвекло, слънчоглед и люцерна)

Чувствителни едногодишни плевели преди братене: :

- Чувствителни плевели: Полска лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*) и видове райграс (*Lolium* spp.).
- Умерено чувствителни плевели: Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*) и видове кощрява (*Setaria* spp.).

Чувствителни едногодишни и/или многогодишни плевели след братене:

- Чувствителни плевели: Полска лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*), Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*), видове кощрява (*Setaria* spp.) и за многогодишен трескот (*Cynodon dactylon*) и балур (*Sorghum halepense*).
- Умерено чувствителни плевели: видове райграс (*Lolium* spp.).

При зеленчукови култури (аспержи, луковични зеленчуци /чесън, лук, шалот/, кореноплодни и грудкови зеленчуци /репички, хрян, ряпа, червено цвекло, пашърнак/, моркови, фенел /резене/, домати и патладжан):

Чувствителни едногодишни плевели преди братене:

- Силно чувствителни плевели: Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*)
- Чувствителни плевели: Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*) и видове кощрява (*Setaria* spp.)
- Умерено чувствителни плевели: Овес (*Avena* spp.) и видове райграс (*Lolium* spp.)

Чувствителни едногодишни и/или многогодишни плевели след братене:

- Силно чувствителни плевели: многогодишен райграс (*Lolium perenne*).
- Чувствителни плевели: овес (*Avena* spp.), Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*) и видове кощрява (*Setaria* spp.), многогодишни трескот (*Cynodon dactylon*), Обикновена ливадина (*Poa trivialis*) и балур (*Sorghum halepense*).
- Умерено чувствителни плевели: видове райграс (*Lolium* spp.)

При овощни градини (лоза, райска ябълка [каки], семкови плодове, костилкови плодове, киви, черупкови дървета [лешник, бадем], декоративни растения, маслини, разсадници за овощни видове и лози):

- Силно чувствителни плевели: Овес (*Avena* spp.), Овсига (*Bromus* spp.), Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*), Видове власатка (*Festuca*

spp.), Ечемик (*Hordeum* spp.) и видове кощрява (*Setaria* spp.) и за многогодишни Обикновена ливадина (*Poa trivialis*).

- Чувствителни плевели: видове райграс (*Lolium* spp.) и за многогодишни балур (*Sorghum halepense*) и трескот (*Cynodon dactylon*).

При цитрусови плодове (портокал, мандарина, лимон, лайм, грейпфрут):

- Силно чувствителни плевели: Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*), многогодишен райграс (*Lolium perenne*). и трескот (*Cynodon dactylon*).
- Чувствителни плевели: Овес (*Avena* spp.), Овсига (*Bromus* spp.), и видове кощрява (*Setaria* spp.)

При памук:

- Силно чувствителни плевели: Кръвно просо (*Digitaria sanguinalis*), Кокоше просо (*Echinochloa crusgalli*) и за многогодишен балур (*Sorghum halepense*).
- Умерено чувствителни плевели: трескот (*Cynodon dactylon*).

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Прилагайте БРИКСТЪН с 15-40 литра вода/дка.

БРИКСТЪН трябва да се прилага върху поникнали плевели в дозите, посочени в следната таблица:

Плевели	Доза на приложение (мл продукт/дка)
Едногодишни житни плевели <i>от 2-3 листа до начало на братене</i>	70 мл/дка
Едногодишни житни плевели <i>След братене, от начало до край на братенето</i>	100 мл/дка
Многогодишни житни плевели <i>За предпочитане при плевели с височина 20-30 см</i>	140 мл/дка (до 200 мл при памук за контрол на трескот / <i>Cynodon dactylon</i> /) (133 мл/дка за овощни видове и лозя)

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ И МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

БРИКСТЪН може да се използва за контрол на житни плевели след поникване на културите, както е посочено в следната таблица:

Култура	Момент на приложение	Доза на приложение (мл продукт/дка)
слънчоглед, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-33 (два листа - поява на трето удължено междувъзлие)	- 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене - 100 мл/дка за едногодишни житни плевели след братене
чесън, лук, шалот, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-45 (втори лист (>3см) ясно видим - достигнат 50% от очаквания диаметър на луковичката или стъблото).	
репички, хрян, ряпа, червено цвекло, пащърнак, моркови, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-45 (разтворен втори същински лист - 50% от очаквания диаметър на корена е достигнат)	
соя, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-49 (разтваря се трилистник на 2-ри възел - жътвените вегетативни растителни части са достигнали окончателния си размер)	- 140 мл/дка за многогодишни житни плевели
картофи, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-39 (разтваряне на вторите листа на главното стъбло	1 приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

	(>4см) - посева се сгъстява напълно)	
захарно цвекло, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-39 (разлистени 2 листа - край на растежа на стъблото)	
резене (фенел), вкл. семепроизводство	ВВСН 12-16 (2 - 6 листа)	
домати, патладжан, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-59 (втори същински лист - девет или повече съцветия)	
люцерна, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-49	
декоративни видове, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-71	
маслодайна рапица, вкл. семепроизводство	ВВСН 20-30 (няма странични разклонения - начало на нарастване на стъблото: няма междувъзлия)	- 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене - 100 мл/дка за едногодишни житни плевели след братене 1 приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
памук, вкл. семепроизводство	ВВСН 12-49 (втори същински лист разтворен - достигане на крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части)	- 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене - 100-140 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене - 140 мл/дка за многогодишни житни плевели и за балур (<i>Sorghum halepense</i>) - 200 мл/дка за контрол на трескот (<i>Cynodon dactylon</i>) 1 приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването.
лозя, киви	Лозя: ВВСН 00-79 (покой - повечето от зърната се събират, грозда се затваря). Киви: ВВСН 00-79	- 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене - 100-133 мл/дка за едногодишни житни плевели след братене
ябълка, круша, дюля, мушмула, кайсия, праскова, нектарина, слива, череша, райска ябълка, леска	ВВСН 00-87 (покой - беритбена зрялост)	- 133 мл/дка за многогодишни житни плевели 1 приложение, изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването
маслини	ВВСН 00-87 (покой - узряване). Да не се прилага върху паднали маслини.	- 70 мл/дка за едногодишни житни плевели до братене - 100 мл/дка за едногодишни житни плевели след братене
бадем, цитруси (портокал, мандарина, лимон, лайм, грейпфрут)	Бадеми: ВВСН 00-87 Цитруси: ВВСН 00-89 (покой – консумативна зрялост)	- 133 мл/дка за многогодишни житни плевели
Разсадници за лозя и овощни видове	ВВСН 00-87 (покой – беритбена зрялост)	До 2 приложения с минимален интервал между приложенията от 20 дни. Изборът на доза е в зависимост от вида на заплевеляването

При редови култури: третирайте, преди културите да покрият напълно реда, за да се гарантира адекватно третиране на плевелите.

При дървесни култури: ограничете приложението в реда/под короната; прилагайте Брикстън върху максимум 30% от почвената повърхност на овощното насаждение.

Техника на приложение: Конвенционална наземна техника

КАРАНТИНЕН СРОК (времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ): Соя, Захарно цвекло - 60 дни; Резене (фенел) - 50 дни; Люцерна, Картофи, Моркови, Репички, Хрян, Ряпа, Червено цвекло, Пащърнак - 40 дни; Чесън, Лук, Шалот - 35 дни; Аспержи - 30 дни; Домати, Патладжан - 28 дни; Леска, Бадем - 20 дни; Кайсия, Праскова, Нектарина, Слива - 14 дни; Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Райска ябълка (каки) - 10 дни; Маслини, Череши, Цитруси (портокал, мандарина, лимон, лайм, грейпфрут), Киви - 7 дни; Лозя - 3 дни.

Карантинен срок не се изисква за маслодайна рапица, памук, слънчоглед, декоративни растения, разсадници за овощни видове.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Предотвратете отнасяне на струята от пръскането към култури и растения, извън третираната площ, обръщайки специално внимание на житни култури, като зърнено-житни култури и царевица. Да се третира при липса на вятър. Употребата на дюзи за намаляване на отвяването редуцират възможността за отнасяне на струята.

Да не се прилага при култури, подложени на стрес.

Избягвайте третираня преди предстоящи дъждове.

Преовлажняване, суша, замръзване или други неблагоприятни почвени и климатични условия, които възпрепятстват активния растеж на плевелите, могат да ограничат правилното абсорбиране и транслокация на БРИКСТЪН и следователно неговата хербицидна активност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

БРИКСТЪН не предизвиква проблеми при нормално отглежданите следващи в сеитбооборота култури.

При необходимост от повторно засяване, всяка двусемеделна култура и ориз могат да се засяват веднага, докато при житни култури е препоръчително да се извърши минимална обработка на почвата преди сеитбата. В случай на директно засяване се препоръчва да се изчака поне 4 седмици.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗИСТЕНТНОСТТА

За да се избегне или забави появата и разпространението на резистентни плевели, се препоръчва редуване или смесване на БРИКСТЪН с продукти с различен механизъм на действие. Препоръчително е да се следват добри агротехнически практики, като ротация на културите или лъжлива сеитба. Следвайте указанията на етикета.

СЪВМЕСТИМОСТ

Ако ще използвате БРИКСТЪН в резервоарна смес с други продукти, предварително направете тест за съвместимост. Предупреждение: Спазвайте по-дългия карантинен срок и посочените правила за безопасност на най-токсичния продукт в случай на смесване с други формулации. В случай на интоксикация уведомете лекаря за използваната смес.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Използвайте с количество на водата 15-40 л/дка.

1. Напълнете резервоара до половината от пълния обем с чиста вода и включете разбъркването.

2. Разклатете добре контейнера и добавете необходимата доза БРИКСТЪН
 3. Добавете вода до достигане на пълния указан обем.
- Продължете да разбърквате разтвора по време на целия процес на приложение.

БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРИТЕ

БРИКСТЪН може да бъде фитотоксичен за култури, които не са посочени на етикета.

Да се избягва отнасяне на работен разтвор към съседни култури. Да се обърне внимание на измиването на оборудването (варел, филтри, помпи, дюзи) с подходящи препарати, преди да го използвате за други култури.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

При вдишване: Осигурете чист въздух и потърсете лекар от съображения за безопасност. В случай на загуба на съзнание поставете пациента в стабилно странично положение за транспортиране.

При контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно.

При контакт с очите: Дръжте клепачите отворени и промивайте внимателно в продължение на няколко минути под течаща вода. Потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Незабавно се обадете на лекар. Изплакнете устата, без да преглъщате, не предизвиквайте повръщане.

При необходимост се свържете с Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

След употреба, опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

ВНИМАНИЕ

Да се използва изключително за целите и при условията, посочени на етикета. Всеки, който използва продукта, носи отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Инструкциите и препоръките на етикета трябва да се спазват, за да се осигури ефикасност от приложението и да се избегнат щети за растения, хора и животни. Да не се прилага чрез въздушно приложение. Следвайте инструкциите за употреба, за да избегнете риска от увреждане на хората и околната среда. Използвайте само при липса на вятър. Да не се продава насипно. Изхвърлете продукта и неговата опаковка в съответствие с действащите разпоредби. Напълно празният контейнер не трябва да се изхвърля в околната среда, а да се изхвърли правилно. Контейнерът не трябва да се използва повторно.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

SIPCAM OXON S.p.A.

Via Sempione 195, Pero (MI), Italy

Tel. +39 02 353781

ДИСТРИБУТОР:

Суммит Агор Румъния СРЛ – клон България КЧТ

1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2

тел: 02 962 4901; факс: 02 962 4876; www.sab.bg

Нето количество: 5 л

Партида №: виж опаковката

Дата на производство: виж опаковката

Срок на годност: 2 години от датата на производство при препоръчаните условия на съхранение